CONFLUENTES MATHEMATICI

François LÊ

Entre géométrie et théorie des substitutions : une étude de cas autour des vingt-sept droites d'une surface cubique

Tome 5, n° 1 (2013), p. 23-71.

[<http://cml.cedram.org/item?id=CML_2013__5_1_23_0>](http://cml.cedram.org/item?id=CML_2013__5_1_23_0)

© Les auteurs et Confluentes Mathematici, 2013.

Tous droits réservés.

L'accès aux articles de la revue « Confluentes Mathematici » (<http://cml.cedram.org/>), implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://cml.cedram.org/legal/>). Toute reproduction en tout ou partie de cet article sous quelque forme que ce soit pour tout usage autre que l'utilisation à fin strictement personnelle du copiste est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

cedram

Article mis en ligne dans le cadre du

Centre de diffusion des revues académiques de mathématiques

<http://www.cedram.org/>

ENTRE GÉOMÉTRIE ET THÉORIE DES SUBSTITUTIONS : UNE ÉTUDE DE CAS AUTOUR DES VINGT-SEPT DROITES D'UNE SURFACE CUBIQUE

FRANÇOIS LÊ

Associer théorie des groupes et géométrie est une idée qui nous est aujourd'hui tout à fait habituelle, à tel point que très certainement, bon nombre de mathématiciens la qualifieraient volontiers de naturelle. On ne peut nier que ce façonnement de notre pensée mathématique est hérité, en grande partie du moins, de la promotion du mélange des groupes et de la géométrie faite par Felix Klein en son temps. Deux familles de travaux célèbres de ce dernier illustrent bien cette promotion. L'une d'elles est consacrée à l'icosaèdre et à l'équation quintique, où Klein incorpore de la géométrie à la résolution d'équations algébriques, [39] ; en 1922, commentant la section de ses *Œuvres* contenant ces travaux, il en exprime une idée phare :

« [Un] principe simple et pour ainsi dire évident [est] que des objets géométriques qui se transforment en eux-mêmes par des groupes finis de substitutions linéaires ont en conséquence des propriétés aisément visibles¹. » [40, p. 255]

L'autre famille de travaux est centrée autour du fameux *Programme d'Erlangen* [38], dont le contenu a particulièrement participé à la diffusion et à l'enracinement de l'idée d'associer théorie des groupes et géométrie. Par exemple pour Jean Dieudonné :

« Le “programme d'Erlangen” de F. Klein est, à juste titre, considéré comme un des jalons les plus importants de l'histoire des mathématiques au XIX^e siècle. Avec un siècle de recul, on peut dire qu'il constitue une sorte de “ligne de partage des eaux” : il apparaît comme un aboutissement de la longue et brillante évolution de la Géométrie projective depuis le début du siècle, qu'il résume, condense et “explique” grâce à la mise en valeur du rôle fondamental joué par le concept de groupe. » [41, p. IX]

Rappelons à ce sujet que, sans en avoir nié l'importance ou l'influence, Thomas Hawkins² a remis en cause le caractère totalement révolutionnaire du *Programme d'Erlangen* — que l'on voit par exemple dans la citation précédente — en montrant d'une part que Sophus Lie et son école ont été fortement liés au développement des idées du *Programme* et d'autre part que ce *Programme* est resté assez largement inconnu pendant une vingtaine d'années suivant sa publication.

Il n'est pas question dans cet article de s'appesantir sur les idées de Klein, mais d'étudier de près une situation particulière, antérieure au *Programme d'Erlangen*, dans laquelle la relation entre groupes et géométrie suscite de nombreux commentaires : il s'agit du lien existant entre les vingt-sept droites d'une surface cubique et les vingt-huit tangentes doubles à une courbe quartique plane et de sa présentation en 1869 par Camille Jordan (1838-1922) et par Carl Friedrich Geiser (1843-1934). Par exemple, dans son *Lehrbuch der Algebra*, Heinrich Weber explicite

1. « [Ein] einfache[s] und sozusagen selbstverständliche[s] Prinzip : [...] daß nämlich algebraische Gebilde, welche durch endliche Gruppen linearer Substitutionen in sich übergehen, in folgedessen leicht übersehbare, ausgezeichnete Eigenschaften haben ». Toutes les traductions dans cet article sont les nôtres.

2. [27].

partiellement le lien dont il est question, en mlangeant trs nettement gomtrie et thorie des groupes :

« Si l'on cherche le groupe des permutations qui laissent inchangee une des racines de l'quation aux tangentes doubles [...], on trouve un groupe qui est encore transitif pour les 27 racines restantes. D'aprs un thorme gomtrique de Geiser, ce groupe est isomorphe au groupe de l'quation de degr 27 dont dpend la rsolution du problme des 27 droites sur une surface du troisime ordre³. » [67, p. 457]

Cette relation apparemment homogne et sans asprit entre thorie des groupes et gomtrie transparat galement dans les commentaires d'historiens :

« Jordan avait l'intention d'illustrer l'efficacit de la thorie des substitutions en montrant comment elle pouvait tre utilise afin de dduire des liens gomtriques (connus) entre des configurations spciales de droites⁴. » [4, p. 341]

L'objectif de cet article est de revenir sur cette relation entre thorie des groupes et gomtrie, autour de la situation des vingt-sept droites d'une surface cubique ; nous serons ainsi amen nuancer plus ou moins fortement les propos que nous venons de citer. Car si la lecture de Jordan seul n'incite effectivement pas problmatiser les rapports entre thorie des groupes et gomtrie, nous verrons au contraire que la lecture conjointe des travaux de Jordan et de Geiser permet de dvoiler un hiatus entre ces deux disciplines⁵. Nous regarderons plus prcisment les travaux de ces deux mathmaticiens sur le lien entre les vingt-sept droites et les vingt-huit tangentes doubles, mais galement sur un lien analogue, entre les vingt-sept droites et les seize droites des surfaces quartiques conique double⁶. En 1869 sont publis sparment deux articles de Geiser : l'un est consacr aux vingt-huit tangentes doubles et l'autre aux seize droites⁷. Ce sont ces articles que nous allons analyser pour comprendre le point de vue de Geiser. Quant Jordan, il tudie ces deux situations du point de vue des quations dans son *Traitt des substitutions et des quations algbriques*⁸, publi en 1870, et plus prcisment dans le chapitre intitul « Applications gomtriques », que nous prsenterons plus tard en dtail.

Jusqu' prsent, nous avons utilis l'expression « thorie des groupes » en l'associant Klein et Jordan. Prcisons que dans les travaux de Jordan dont il va s'agir dans la suite de cet article, cette thorie des groupes est la thorie des substitutions telle que Jordan la dveloppe dans son *Traitt des substitutions et des quations algbriques* — il ne s'agit donc pas de groupes de transformations comme l'entend Klein dans le *Programme d'Erlangen*⁹. Prcisons galement que dans les parties du

3. « Wenn man die Gruppe der Permutationen aufsucht, die eine der Wurzeln der Doppeltangentengleichung ungendert lassen, so findet man eine Gruppe, die fr die brigen 27 Wurzeln noch transitiv ist. Diese Gruppe ist nach einem geometrischen Satze von Geiser isomorph mit der Gruppe der Gleichung 27^{sten} Grades, von der die Lsung des Problems der 27 Geraden auf einer Flche dritter Ordnung abhngt. »

4. « Jordan aimed at illustrating the efficiency of the theory of substitutions in showing how it could be used to deduce some (known) geometric connections between special configurations of lines. »

5. Pour les notions de discipline et de thorie en histoire des mathmatiques ainsi que de nombreuses rfrences ce sujet, voir [18, p. 21].

6. Voir le dbut de la section 2 pour des explications quant ces seize droites.

7. Respectivement [21] et [22].

8. [34].

9. Voir [41, p. 36] et [69, p. 188]. Notons tout de mme que Klein indique clairement vouloir calquer sa thorie des transformations sur celle des substitutions : « Dans la thorie de Galois telle qu'elle est expose, par exemple, dans le *Traitt d'Algbre suprieure* de Serret ou dans le *Traitt des substitutions* de C. Jordan, ce qui fait proprement l'objet des recherches, c'est la thorie mme des groupes ou des substitutions ; la thorie des quations en dcoule comme application. Par analogie, nous voudrions une *thorie des transformations*, une thorie des groupes qui peuvent

Traité des substitutions que nous allons étudier, les groupes en question sont bien des groupes de substitutions incarnés, et non pas abstraits¹⁰, comme le souligne Jeremy Gray :

« [Jordan] a analysé dans le *Traité* une large gamme de situations dans lesquelles des groupes pouvaient être formés en permutant des droites (les 27 droites d'une surface cubique, les 28 bitangentes à une quartique) [...]. La capacité de Jordan à articuler une puissante théorie des groupes finis et à les reconnaître "en nature" plaide certainement pour une compréhension implicite de l'idée de groupe, présentée uniquement par commodité sous l'habit plus familier (pour son public) des groupes de permutations¹¹. » [25, p. 118]

Une grande partie de ce que nous allons étudier dans la suite de cet article se trouve donc dans le *Traité des substitutions* de Jordan, important ouvrage dont le but explicite est de

« développer les méthodes de Galois et de les constituer en corps de doctrine, en montrant avec quelle facilité elles permettent de résoudre tous les principaux problèmes de la théorie des équations. » [34, p. VII]

En fait, ce livre représente à la fois l'aboutissement et la synthèse de la dizaine d'années de recherches sur la théorie des substitutions que Jordan a menées depuis sa thèse de 1861. Ouvrage à succès, le *Traité des substitutions* constitue pour les historiens

« un tournant majeur dans le développement de la notion de groupe et de la théorie de Galois, marquant l'achèvement du processus de clarification des idées de Galois sur la résolubilité des équations¹². » [13, p. 144]

Outre le chapitre des « Applications géométriques » dont nous avons déjà parlé, le *Traité* en comporte un autre concernant les « Applications à la théorie des transcendentes ». Ces deux chapitres contiennent plusieurs résultats que d'autres mathématiciens ont redémontré par la suite¹³. Parmi ces résultats, le lien entre les vingt-sept droites des surfaces cubiques et les seize droites des surfaces quartiques à conique double, retrouvé par Geiser ; mais également l'abaissement d'une équation liée aux seize points singuliers des surfaces de Kummer (cf. *infra* pour quelques détails), retrouvé par Klein ; le caractère monodrome des racines de l'équation de bissection des fonctions elliptiques et hyperelliptiques, retrouvé par Francesco Brioschi ; enfin, un lien entre l'équation aux vingt-sept droites et celle de la trisection des fonctions hyperelliptiques, retrouvé par Alfred Clebsch et Luigi Cremona. Pour Frédéric Brechenmacher, ce dernier résultat était « un des principaux résultats originaux du Livre III et a ainsi joué un rôle clé pour la légitimité du *Traité* comme un tout

être engendrés par des transformations d'une nature donnée. » [41, p. 36]. Nous reviendrons sur ce point à la fin de l'article.

10. C'est l'occasion de rappeler au lecteur que la hiérarchie groupes – anneaux – corps à laquelle notre époque nous a habitués ne reflète pas le développement historique de ces notions. Ainsi, le développement de la théorie des groupes (de Galois ou de transformations géométriques) s'est fait, jusqu'au début du XX^e siècle du moins, indépendamment et parallèlement à celui de la théorie des corps (de nombres ou de fonctions). Voir [12].

11. « [Jordan] analysed in the *Traité* a wide range of situations in which groups could be formed permuting lines (the 27 lines on a cubic surface, the 28 bitangents to a quartic) [...]. Jordan's capacity to articulate a powerful theory of finite groups and to recognise them "in nature" surely argues for an implicit understanding of the group idea presented for convenience only in the more familiar grab (to his audiences) of permutation groups. »

12. Voir [13], dont est tirée la présente citation, pour une analyse de la relecture des travaux de Galois (en particulier par Jordan, p. 173-182).

13. Voir [35, p. 32-33].

ainsi que pour sa rception premire ¹⁴ ». Pour autant, nous n'en parlerons que peu dans la suite : faisant intervenir des objets issus de l'analyse — les fonctions hyper-elliptiques —, l'articulation disciplinaire exprime par ce rsultat est diffrente de celle sur laquelle nous souhaitons nous focaliser, savoir l'articulation entre thorie des substitutions et gomtrie.

Cela tant, on voit ainsi que les liens entre droites qui nous intressent font partie de ces rsultats du *Trait des substitutions* qui circulent ds sa parution et qui participent en partie au succs que nous avons voqu prcdemment. Ce succs est d'ailleurs attest par les lettres de flicitations que Jordan reoit suite la parution du *Trait* en particulier de la part des mathmaticiens ayant cherch redmontr les rsultats que nous venons d'voquer ¹⁵. Malheureusement pour notre problme, nous n'avons trouv aucune lettre change entre Jordan et Geiser ; nous nous baserons donc presque exclusivement sur leurs travaux mathmatiques publis.

Maintenant, afin de pouvoir suivre Jordan le plus fidlement possible lorsque nous regarderons son approche du problme des vingt-sept droites et des autres configurations de droites associes, nous exposerons les « mthodes de Galois » tel qu'il le fait lui-mme dans le *Trait des substitutions*. Avant cela, puisque ce sont les vingt-sept droites qui forment la thmatique mme de notre propos, nous commenons par quelques mots leur sujet ; ils seront galement utiles pour comprendre les recherches de Jordan.

1. PROLGOMNES

1.1. Vingt-sept droites sur une surface cubique. En 1849 est publi dans le *Cambridge and Dublin mathematical Journal* un article d'Arthur Cayley dans lequel celui-ci prouve que toute surface cubique contient exactement vingt-sept droites. Cayley y prcise que ce rsultat avait t tabli lors d'une correspondance entre lui-mme et George Salmon ¹⁶. Ce dernier le confirme dans son *Treatise on the analytic geometry of three dimensions* ¹⁷ et ajoute que c'est lui-mme qu'est due la dtermination du nombre, 27, aprs que Cayley en a eu tabli l'existence. Ouvrant la voie une recherche dense sur les surfaces cubiques ¹⁸, l'existence des vingt-sept droites, « squelette » ¹⁹ de leur surface, a t considre comme un fait majeur par les contemporains de Cayley et de Salmon :

« Avec certainement autant de bonnes raisons qu'Archimde a fait graver le cylindre, le cne et la sphre sur sa pierre tombale, nos minents compatriotes pourraient laisser des instructions testamentaires pour que l'eikosiheptagramme cubique soit grav sur la leur ²⁰. »
[65, p. 155]

14. « This theorem was indeed one of the main original results of Livre *III* and therefore played a key role for the legitimacy of the *Trait* as a whole as well as for its early reception ». [4, p. 341]. Voir cette rfrence plus gnralement pour les questions de collectifs autour de la relation entre les travaux de Jordan et de Galois.

15. Nous aurons l'occasion de parler trs brivement de l'change entre Cremona et Jordan la fin de cet article. Les lettres reues par Jordan sont conserves aux Archives de l'cole Polytechnique.

16. Salmon publie d'ailleurs dans le mme volume du *Cambridge and Dublin mathematical Journal* un article dont l'introduction prcise qu'il est un supplment celui de Cayley : [56, p. 496].

17. [58].

18. [61, p. 36].

19. [64, p. 980].

20. « Surely with as good reason as had Archimedes to have the cylinder, cone and sphere engraved on his tombstone might our distinguished countrymen leave testamentary directions for the cubic eikosiheptagram to be engraved on theirs. » L'eikosiheptagramme dsigne la figure forme des vingt-sept droites. Nous n'avons vu apparatre ce terme que dans ce passage crit par Sylvester : il participe ainsi au « style typiquement ampoul » de celui-ci, [28, p. 2].

Nous en resterons là quant à la célébrité ou les conséquences de la découverte des vingt-sept droites et renvoyons le lecteur à [28], [48] ou [43] pour des renseignements historiques sur le sujet ainsi que de nombreuses références.

FIGURE 1.1. Modèle en plâtre de la surface dite « surface diagonale de Clebsch », ayant la particularité de comporter 27 droites réelles. Elle a pour équation homogène $x^3 + y^3 + z^3 + w^3 - (x + y + z + w)^3 = 0$. Ce modèle fait partie d'une série de plusieurs modèles de surfaces cubiques datant de 1881. Voir [15], où d'autres photographies sont disponibles.

Précisons quelques points. D'une part, Cayley et Salmon utilisaient pour les surfaces cubiques des équations de la forme $U(x, y, z, w) = 0$, où U est un polynôme homogène de degré 3 dont les coefficients sont implicitement supposés complexes et où les inconnues x, y, z, w représentent des coordonnées homogènes de l'espace. Que ces coordonnées homogènes soient des nombres complexes est également implicite ; ainsi, Cayley et Salmon prenaient en compte des points imaginaires et des points situés à l'infini²¹. Au niveau des vingt-sept droites, certaines peuvent ainsi être

21. Cette considération de points imaginaires ou situés à l'infini est chose standard en ce milieu du XIX^e siècle. On attribue généralement à Jean-Victor Poncelet la systématisation (dans les années 1820) de l'introduction de ces points. Voir par exemple [3, p. 165]. En termes actuels, les surfaces cubiques sont donc des surfaces algébriques de degré 3 dans l'espace projectif complexe $\mathbf{P}_3(\mathbf{C})$. Cela étant dit, soulignons bien qu'en 1849, la notion d'espace projectif n'était pas encore dégagée. Pour des éléments d'une histoire de l'espace projectif, voir [1].

situes toutes entires l'infini ou n'avoir aucun point rel ²². D'autre part, Cayley et Salmon avaient dj remarqu dans leurs articles de 1849 que la prsence de singularits sur une surface cubique exige la mise en place d'une multiplicit de comptage des droites afin que le nombre 27 reste valable. Cette remarque tant faite, nous n'aurons dornavant plus nous en occuper : dans les textes que nous allons tudier, les surfaces cubiques sont toujours supposes, au moins implicitement, sans singularits.

Il est utile pour la suite d'expliquer quelques configurations particulires des vingt-sept droites. Dans son article de 1849, Cayley avait dj montr que chacune des 27 droites en rencontre exactement 10 autres, et que ces 10 droites se rencontrent deux par deux, crant ainsi 5 triangles avec la premire droite. Par un dnombrement ais, il montrait ainsi qu'on peut former 45 triangles ²³ partir des 27 droites d'une surface cubique. Remarquons que ces configurations de droites en triangles permettent d'apprhender les relations d'incidence qu'existent entre les vingt-sept droites.

Avec ces 45 triangles, il est possible de former certaines paires de tridres particuliers puis de grouper ces paires trois par trois. Ces tridres ont t mis en vidence par Jacob Steiner en 1856 et ont par la suite t baptiss *tridres de Steiner*. Les dfinitions prcises de ces tridres, de leurs paires et des triplets de ces paires n'tant pas essentielles pour la suite, nous les omettons volontairement ²⁴. Le lecteur pourra toutefois retenir qu'il existe 40 tels triplets de paires de tridres.

Une autre configuration remarquable est celle de *double-six*, qui est un ensemble de douze droites $a_1, \dots, a_6, b_1, \dots, b_6$ soumises la rgle d'incidence suivante : si on note ces droites dans un tableau

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 \end{pmatrix},$$

chaque droite rencontre toutes les droites qui ne sont ni sur la mme ligne, ni sur la mme colonne. Par exemple, la droite a_1 rencontre b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 , et aucune des autres. C'est Ludwig Schlfli, en 1858 ²⁵, qui a dfini ces doubles-six et montr qu'avec les 27 droites d'une surface cubique, on pouvait former exactement 36 doubles-six.

Avec ces trois configurations particulires formes partir des vingt-sept droites, nous avons donn quasiment toutes les informations concernant les vingt-sept droites sur lesquelles se base Jordan dans son approche du problme de ces droites. Entrons prsent dans le *Trait des substitutions*.

1.2. Les « mthodes de Galois ». Les « mthodes de Galois » sont exposes par Jordan dans le premier chapitre du livre III du *Trait*, intitul « Des irrationnelles ». La plupart des dfinitions et de la terminologie qu'on y trouve (adjonction, quantits rationnelles, groupe d'une quation, irrductibilit, rsolution d'une quation par adjonction, rduites) sont celles qu'utilise variste Galois dans son *Mmoire sur les conditions de rsolubilit des quations par radicaux* (1831), rest indit jusqu'en 1846, anne o Joseph Liouville fait publier les *uvres mathmatiques d'variste Galois* ²⁶. Dans ce qui suit, nous exposons ces dfinitions en suivant Jordan et les accompagnons d'interprtations actuelles afin d'en faciliter la comprhension.

Comme Jordan, nous nous donnons une quation algbrique $F(x) = 0$ de degr m , de racines $x_1, x_2, \dots, x_m$. Il est ici sous-entendu que les coefficients de F appartiennent un sous-corps k de $\mathbf{C}$. Des quantits $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ sont alors dites *adjointes* l'quation si on considre que les coefficients de l'quation $F(x) = 0$ sont

22. En 1858, Ludwig Schlfli montre que lorsqu'une surface cubique a une quation coefficients rels, le nombre de droites relles est ncessairement 27, 15, 7 ou 3. [59].

23. Cayley et Salmon parlent plutt de *plans tangents triples*.

24. Voir par exemple [63] ou [28] pour des dtails sur ces dfinitions.

25. [59].

26. [17].

dans le corps $k(\xi_1, \dots, \xi_r)$. Jordan appelle *rationnelle* toute quantité exprimable de façon rationnelle en fonction des coefficients de l'équation et des quantités adjointes, c'est-à-dire tout élément de $k(\xi_1, \dots, \xi_r)$.

Le théorème fondamental que donne Jordan est celui concernant l'existence du groupe d'une équation :

THÉORÈME FONDAMENTAL : THÉORÈME I. — Soit $F(x) = 0$ une équation dont les racines $x_1, \dots, x_m$ sont toutes inégales, et à laquelle on peut supposer qu'on ait adjoint certaines quantités auxiliaires $y, z, \dots$. Il existera toujours entre les racines $x_1, \dots, x_m$ un groupe de substitutions tel, que toute fonction des racines, dont les substitutions de ce groupe n'altèrent pas la valeur numérique, soit rationnellement exprimable, et réciproquement. [34, p. 257]

En termes modernes, ce théorème dit qu'il existe un sous-groupe, disons G , du groupe de permutations $\mathfrak{S}(x_1, \dots, x_m)$ tel que le sous-corps de $(k(y, z, \dots))$ $(x_1, \dots, x_m)$ fixé par G est précisément $k(y, z, \dots)$. Il s'agit bien entendu du groupe de Galois²⁷ de F sur $k(y, z, \dots)$. Dans le cas où aucune quantité n'est adjointe, le groupe est plus simplement baptisé *groupe de l'équation*. Si au contraire des quantités $y, z, \dots$ sont adjointes, Jordan l'appelle le *groupe de l'équation relatif aux quantités adjointes*, ou encore *groupe réduit par l'adjonction de $y, z, \dots$* . Si ce théorème fondamental avait déjà été énoncé — de façon quasi identique — et démontré par Galois²⁸, Jordan indique que le théorème qu'il donne ensuite lui revient²⁹. Il s'agit d'un théorème concernant l'irréductibilité d'une équation³⁰ :

THÉORÈME II. — Toute équation irréductible $F(x) = 0$ a son groupe transitif, et réciproquement. [34, p. 259]

La *transitivité* du groupe signifie que, si l'on choisit deux racines quelconques de l'équation, on peut toujours trouver une substitution du groupe qui envoie l'une sur l'autre : cela coïncide avec la définition actuelle d'action transitive. Profitons du moment pour donner la définition de Jordan d'un groupe *k fois transitif*, dans le cadre du groupe d'une équation. Elle coïncide avec la définition actuelle d'action au moins k fois transitive : pour toute paire de k -uplets $(\xi_1, \dots, \xi_k)$ et $(\xi'_1, \dots, \xi'_k)$ de racines, on peut toujours trouver une substitution du groupe de l'équation envoyant ξ_i sur ξ'_i pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

Une autre notion est la *primitivité* d'un groupe, que Jordan définit à l'envers : un groupe G est dit *non primitif* s'il est possible de regrouper les lettres sur lesquelles il agit en paquets contenant tous le même nombre de lettres, et tels que toute substitution de G envoie les éléments d'un paquet sur les éléments d'un même paquet. Une équation est dite *primitive* lorsque son groupe est primitif³¹.

Jordan indique d'ailleurs dans la préface du *Traité* que les trois notions fondamentales de la théorie des substitutions sont la transitivité, la primitivité et surtout la distinction entre groupes simples et composés, et en attribue les paternités respectives à Augustin-Louis Cauchy, à Carl Friedrich Gauss et Niels Henrik Abel, et à Galois. Jordan pose ainsi les jalons d'une certaine histoire de la théorie des substitutions, mais cette histoire est à lire avec circonspection : par exemple, l'*Encyklopädie*

27. Dans la théorie de Galois telle qu'elle est le plus souvent enseignée de nos jours, on définit d'abord le groupe de Galois d'une extension (galoisienne) de corps k'/k comme étant le groupe des automorphismes de k' induisant l'identité sur k . Si $F \in k[X]$ est un polynôme séparable, le groupe de Galois de l'équation $F(x) = 0$ est par définition le groupe de Galois d'une extension de décomposition de F sur k . On montre alors que tout élément de ce groupe induit une permutation des racines de F .

28. [17, p. 421].

29. [35, p. 29].

30. La notion d'irréductibilité est la même que celle que nous apprenons aujourd'hui : pour Jordan, une équation est *irréductible* lorsqu'elle n'a aucune racine commune avec aucune équation de degré moindre et à coefficients rationnels. Voir [34, p. 254].

31. [34, p. 34].

der mathematischen Wissenschaften attribue la paternit des notions de transitivit et de primitivit Paolo Ruffini³².

Passons maintenant quelques thormes dcrivant le comportement du groupe d'une quation lorsqu'on lui adjoint certaines quantits particulires. Jordan considre d'abord le cas o est adjointe une fonction des racines de l'quation :

THORME V. — Soient G le groupe d'une quation $F(x) = 0$, φ_1 une fonction rationnelle quelconque de ses racines : 1 celles des substitutions de G qui n'altrent pas la valeur numrique de φ_1 forment un groupe H_1 ; 2 l'adjonction de la valeur φ_1 rduira le groupe de l'quation prcisment H_1 . [34, p. 261]

En termes modernes, ce thorme dit que si $\varphi_1 \in k(x_1, \dots, x_m)$, alors l'ensemble des permutations de G qui fixent φ_1 est un sous-groupe H_1 de G tel que

$$\text{Gal}(k(x_1, \dots, x_m)/k(\varphi_1)) = H_1.$$

En outre, Jordan nonce en corollaire que l'adjonction de plusieurs fonctions des racines φ_1, φ'_1 , etc., rduit le groupe de l'quation son sous-groupe form des substitutions qui fixent φ_1, φ'_1 , etc. Anticipons un peu sur la suite : dans son tude des quations de la gomtrie, Jordan va surtout adjoindre ces quations une ou plusieurs de leurs racines. Dans le cas de l'adjonction d'une racine x_1 , le groupe H_1 est donc, en termes d'actions de groupes, le stabilisateur de x_1 sous G .

Enfin, Jordan adjoint une quation des racines d'une autre quation $f(z) = 0$. Il montre alors que si l'on adjoint l'quation $F(x) = 0$ (dont le groupe est G) toutes les racines de $f(z) = 0$, le groupe rduit, galement appel *groupe rduit par la rsolution de $f(z) = 0$* , est permutable aux substitutions de G . Un corollaire est le suivant :

COROLLAIRE. — Si le groupe G est simple, il ne peut tre rduit par la rsolution d'une quation auxiliaire sans se rduire la seule substitution I [...] : auquel cas l'quation $F(x) = 0$ sera compltement rsolue. [34, p. 269]

Dire que l'quation $F(x) = 0$ est *rsolue* par l'adjonction des racines $z_1, \dots, z_n$ de $f(z) = 0$ signifie ainsi que toutes les racines de F s'expriment rationnellement en fonction de $z_1, \dots, z_n$. Cela se traduit donc par l'inclusion $k(x_1, \dots, x_m) \subset k(z_1, \dots, z_n)$. Le thorme suivant indique comment deux quations se rsolvent l'une l'autre. Dieudonn indique qu'il s'agit d'un « important complment » aux rsultats de Galois, d Jordan³³.

THORME XIII. — Soient $F(x) = 0$ et $f(z) = 0$ deux quations dont les groupes G et G' contiennent respectivement N et N' substitutions. Si la rsolution de la seconde quation rduit le groupe de la premire un groupe H_1 ne contenant plus que $\frac{N}{\nu}$ substitutions, rciproquement la rsolution de la premire rduira le groupe de la seconde un groupe H'_1 ne contenant plus que $\frac{N'}{\nu}$ substitutions. De plus, les deux quations sont composes avec une mme quation auxiliaire $\mathcal{F}(u) = 0$ de degr ν et dont le groupe contient ν substitutions. [34, p. 269]

32. [31, p. 487-488]. Par ailleurs, signalons que Olaf Neumann a particulirement insist sur l'importance de la notion d'irrductibilit dans le dveloppement de la thorie des quations. Voir [50].

33. [36, p. XVIII].

En guise de traduction moderne, résumons avec un diagramme ce théorème concernant ce que nous appelons les extensions composées :

Un corollaire donné par Jordan³⁴ est que si le groupe G d'une équation $F(x) = 0$ est simple, celle-ci ne peut être résolue qu'au moyen d'équations dont le groupe ait pour ordre un multiple de l'ordre de G .

La notion de résolution d'une équation par un autre mène à celle d'équations *équivalentes*³⁵ : les équations $F(x) = 0$ et $f(z) = 0$ sont dites équivalentes si la résolution de l'une entraîne la résolution de l'autre, et réciproquement. Vu ce que nous avons écrit précédemment, cela revient à dire que $k(x_1, \dots, x_m) = k(z_1, \dots, z_n)$.

Enfin, la notion de *réduite* d'une équation est très souvent utilisée par Jordan, mais n'est pas définie dans le *Traité*³⁶. Si une équation $F(x) = 0$ est donnée, une réduite de cette équation est une équation irréductible sur le corps k telle que l'adjonction d'une de ses racines a pour effet d'abaisser le groupe G de $F(x) = 0$. Ainsi, si le groupe G est réduit à un groupe H , le degré de la réduite est égal à l'indice de H dans G ³⁷, et comme l'écrit Jean Dieudonné,

« [le] problème classique de la recherche des « réduites » d'une équation³⁸ [...] revient évidemment à la recherche des sous-groupes de [son] groupe, et les réduites de plus petit degré, objet principal de

34. Il s'agit du COROLLAIRE I, [34, p. 270].

35. Contrairement aux autres notions données par Jordan, celle d'équations équivalentes n'apparaît pas dans les écrits de Galois. Une autre notion d'équivalence existait déjà pour les formes algébriques, et notamment pour les formes quadratiques : deux formes quadratiques q_1 et q_2 étaient dites équivalentes si elles vérifiaient l'identité $q_1(x, y) = q_2(ax + by, cx + dy)$ pour tous les entiers a, b, c, d tels que $ad - bc = 1$. Dans ce cadre-là, un problème consistait à trouver les différentes classes d'équivalence et à y distinguer une forme particulière représentant cette classe. On peut voir une certaine analogie avec la notion d'équivalence d'équations algébriques de Jordan car dans le *Traité*, ce dernier propose de « déterminer toutes les équations irréductibles équivalentes à une équation donnée », et définit de cette façon des *classes* d'équations équivalentes. Voir [34, p. 271-272]. Nous remercions Frédéric Brechenmacher pour ses indications sur cette notion d'équivalence d'équations.

36. Dans son *Cours d'Algèbre supérieure*, Joseph-Alfred Serret indique à plusieurs reprises, en mentionnant Joseph-Louis Lagrange, que les termes « réduite » et « résolvante » sont synonymes : voir par exemple [62, p. 202, p. 235]. En revanche, dans le *Traité des substitutions*, Jordan n'emploie jamais le terme « résolvante ». Cela traduit peut-être la volonté de Jordan de se détacher des méthodes de Lagrange, dont les limites sont évoquées dès le deuxième paragraphe de la préface du *Traité*.

37. Si $f(x) = 0$ est la réduite en question et si k' en est un corps de rupture (ce qui correspond à l'adjonction d'une des racines de f), le degré de f est égal au degré de l'extension k'/k , donc à l'indice de H dans G , puisque $G = \text{Gal}(F/k)$ et $H = \text{Gal}(F/k')$.

38. La recherche de formations de réduites, ou résolvantes, d'une équation avait été initiée autour de 1770 par Lagrange, Alexandre-Théophile Vandermonde et Edward Waring. Le but était d'étudier la résolubilité des équations algébriques en introduisant ces équations auxiliaires particulières. Voir par exemple [50].

ces recherches, correspondent aux sous-groupes *maximaux*. » [36, p. XXIII]

Nous avons ainsi prsent l'essentiel du chapitre premier du livre « Des irrationsnelles ». Les trois autres chapitres de ce livre sont consacrs des applications des mthodes du premier chapitre ainsi que des livres I et II du *Traite* ; ils sont intituls, dans l'ordre, « Applications algbriques », « Applications gomtriques » et « Applications la thorie des transcendentes ». L'tude de l'quation correspondant aux vingt-sept droites se trouve bien entendu dans le troisime de ces chapitres.

2. LES QUATIONS DE LA GOMTRIE

Chapeaut par une courte introduction dont nous allons dtailler le contenu dans la section 2.1, le chapitre des « Applications gomtriques » est constitu de six paragraphes, chacun d'eux tant consacr une situation particulire :

I quation de M. Hesse.

II quations de M. Clebsch.

III Droites situes sur les surfaces du quatrime degr conique double.

IV Points singuliers de la surface de M. Kummer.

V Droites situes sur les surfaces du troisime degr.

VI Problmes de contact.

Expliquons brivement de quoi il s'agit. Le I concerne les neuf points d'inflexion que possde toute courbe cubique plane. Le II se rapporte aux courbes cubiques ayant des contacts d'ordre 4 avec une courbe quartique donne et d'autres « problmes de contact »³⁹.

Si une surface algbrique est de degr 4, son intersection avec un plan est une courbe (plane) de degr 4. Il peut arriver que cette courbe quartique se rduise une conique compte avec multiplicit 2. En termes analytiques (c'est--dire de gomtrie analytique : avec des quations), cela signifie que la courbe quartique-intersection a une quation de la forme $f(x, y, z)^2 = 0$ avec f de degr 2. Les surfaces quartiques pour lesquelles cela arrive sont les « surfaces quartiques conique double ». Tout comme les surfaces cubiques possdent vingt-sept droites, ces surfaces-l possdent toutes seize droites⁴⁰ ; elles font l'objet du III. La surface de Kummer du IV est une surface quartique qui possde le nombre maximal de points singuliers que peuvent avoir ces surfaces, savoir 16.

Nous avons dj parl des droites des surfaces cubiques qui font l'objet du V. Enfin, le VI est consacr aux courbes d'ordre $n - 3$ tangentes en $n(n - 3)/2$ points une courbe de degr n donne. Pour $n = 4$, il s'agit donc des tangentes doubles une courbe quartique, au nombre de 28 — ce nombre a t dtermin en 1839 par Julius Plcker, en application des formules qui portent maintenant son nom⁴¹.

Nous pouvons voir dans les titres des six paragraphes que deux des situations y sont incarnes en quations (I et II). Sans commentaire de la part de Jordan ce sujet, nous ne pouvons qu'mettre des hypothses quant un tel choix, au demeurant assez curieux. En effet, il n'y a pas de diffrence notable au niveau des contenus (mthodes, rsultats) des paragraphes, et en particulier, les quations des I et II ne sont pas particulirement mises en avant par rapport aux autres. Par ailleurs, si le nom de Hesse tait, en 1870, rgulirement associ l'quation donnant les neuf points d'inflexion — justifiant ainsi son emploi dans le premier titre —, on ne peut pas en dire autant du nom de Clebsch et de l'quation dterminant les

39. [34, p. 308].

40. D'aprs [11, p. 34], c'est Gaston Darboux qui a vu ce rsultat le premier, en 1863.

41. Voir la notice ncrologique de Plcker crite par Clebsch pour quelques dtails historiques : [47, p. 199].

courbes cubiques du §II⁴². Cette attribution par Jordan du nom de Clebsch à une famille d'équations montre en tout cas que Jordan souhaite conférer à ce dernier une place certaine dans l'étude de ces équations.

Au sujet de l'influence de Clebsch justement, la lecture des premières lignes de ces six paragraphes révèle, dans trois d'entre eux, des références explicites à ce mathématicien allemand, et en particulier à son mémoire *Ueber die Anwendung der Abelschen Functionen in der Geometrie*⁴³. Et effectivement, Jordan indique dans la préface du *Traité* l'importance qu'a eue Clebsch sur l'écriture du chapitre des applications géométriques⁴⁴ :

« Nous tenons également à remercier MM. Clebsch et Kronecker des précieuses indications qu'ils nous ont fournies. C'est grâce aux libérales communications de M. Clebsch que nous avons pu aborder les problèmes géométriques du Livre III, Chapitre III. » [34, p. XIII]

À présent, expliquons rapidement la structure des six paragraphes. Dans chacun de ces cas, Jordan forme l'équation associée (cf. *infra* pour les détails) et l'étudie grâce à son groupe,

« dont la connaissance permet réciproquement de rechercher les propriétés plus cachées que présente l'équation, et notamment celles qui concernent sa résolution ». [33]

De fait, Jordan en détermine l'ordre, les facteurs de composition⁴⁵ ainsi que les groupes partiels (en termes modernes : les sous-groupes) remarquables, et en déduit diverses réduites de l'équation correspondante.

Il est intéressant de remarquer que Jordan conclut la plupart des paragraphes constituant le chapitre en énonçant des théorèmes plus généraux concernant des familles d'équations englobant celles de la géométrie. Par exemple, le paragraphe I se clôt avec un théorème sur certaines équations dont l'équation aux neuf points d'inflexion est un cas particulier : les équations irréductibles de degré 9 telles que, étant données deux de ses racines a, b , on puisse en déduire une troisième c de sorte que

$$c = \psi(a, b), \quad b = \psi(c, a), \quad a = \psi(b, c),$$

où ψ est une fonction rationnelle et symétrique. Ces équations ont été étudiées par Otto Hesse dans un article de 1847⁴⁶. Hesse montre en particulier que ces équations sont résolubles par radicaux, puis que l'équation donnant les neuf points d'inflexion en est un cas particulier. Jordan donne, toujours dans ce paragraphe I, une autre classe d'équations : celles de degré 8 telles que, étant données trois racines a, b, c , on puisse en trouver une autre d telle que $d = \psi(a, b, c)$, $c = \psi(d, a, b)$, $b = \psi(c, d, a)$, $a = \psi(b, c, d)$. Il indique que ces équations ont été traitées par Émile Mathieu et qu'elles « se traitent exactement par les mêmes principes » que les autres équations du §I dont nous venons de parler⁴⁷. Ce processus de généralisation traduit peut-être

42. Cette équation n'est d'ailleurs citée ni dans [31], ni dans [11].

43. En français : *Sur l'application des fonctions abéliennes à la géométrie*, [7].

44. Les auteurs de la Notice sur les travaux de Clebsch rappellent eux aussi cette influence : « c'est principalement à [Clebsch] qu'on est redevable d'avoir mis Camille Jordan en état de consacrer aux équations de la Géométrie un chapitre spécial dans son grand Ouvrage », [11, p. 47], traduit en français dans [35, p. 33].

45. Jordan définit les facteurs de composition d'un groupe en [34, p. 41]. En termes modernes, il montre que, étant donné un groupe G , il existe une suite de groupes $G \supset H \supset H' \supset \dots \supset \{1\}$, telle que chacun des groupes soit le plus grand (au sens de l'inclusion) groupe distingué dans le précédent. Les indices $(G : H)$, $(H : H')$, $\dots$ sont les *facteurs de composition* de G . Jordan montre que ceux-ci sont uniques à l'ordre près.

46. [29].

47. Sans détailler ces principes, il s'agit à chaque fois d'introduire une notation adéquate des racines, puis une fonction algébrique de ces racines dont le groupe est égal à celui de l'équation. Voir *infra* pour les détails, dans les cas des vingt-sept droites, des vingt-huit tangentes doubles et des seize droites.

la volont de Jordan de mettre jour, *via* des quations de la gomtrie pour ainsi dire prtes tre tudies, des classes d'quations dont il peut noncer des rsultats quant leur rsolubilit, inscrivant ainsi bel et bien le chapitre des applications gomtriques dans le chemin trac dans la prface du *Trait* :

« Le problme de la rsolution par radicaux, qui nagure semblait encore former l'unique objet de la thorie des quations, n'apparat plus que comme le premier anneau d'une longue chane de questions relatives aux transformations des irrationsnelles et leur classification. » [34, p. VI]

De ce fait, les classes d'quations donnes par la gomtrie (dont l'quation de M. Hesse » et les quations de M. Clebsch », voir *supra*), rejoignent par exemple les quations abliennes et les quations de Galois qui font l'objet du chapitre des Applications algbriques ».

Pour tudier ces quations de la gomtrie, Jordan suit systmatiquement une mthode qu'il dcrit dans le paragraphe introductif. Cette mthode est galement donne, de faon plus condense et avec d'autres mots, dans le premier paragraphe d'une Note des *Comptes Rendus de l'Acadmie des Sciences* du 15 mars 1869, intitule « Sur les quations de la gomtrie »⁴⁸. Cette Note fait partie de la srie de publications de Jordan qui ont annonc la parution du *Trait* et dont le contenu a t peu ou prou reproduit tel quel dans cet ouvrage. Dans cette srie se trouve galement un article publi dans le *Journal de Liouville* et consacr au problme des vingt-sept droites⁴⁹ ; nous aurons l'occasion de nous en servir dans la suite.

2.1. tude des quations de la gomtrie : *modus operandi*. Nous dcrivons donc ici le mode opratoire propos par Jordan pour tudier les quations de la gomtrie. Nous illustrons chacun des points de la mthode avec le problme des vingt-sept droites, en indiquant en note de bas de page ce qui est omis par Jordan.

Le chapitre du *Trait* concernant les applications gomtriques dbute ainsi :

« L'un des problmes les plus frquents de la gomtrie analytique est de dterminer quels sont les points, ou bien les lignes ou surfaces d'une espce donne, qui satisfont certaines conditions. Lorsque le nombre des solutions est limit, les coordonnes du point cherch (ou les paramtres que renferme l'quation des lignes ou surfaces cherches) sont dtermines par un systme d'quations algbriques [...] en nombre gal celui des inconnues ». [34, p. 310]

Jordan poursuit en notant X l'quation obtenue en liminant entre les quations dudit systme toutes les inconnues sauf une. chacune des racines de cette quation correspond une solution du problme en question, et en particulier, le degr de cette quation est gal au nombre des objets (points, lignes ou surfaces) cherchs⁵⁰. C'est

48. [33]. Dans cette note, Jordan annonce en particulier que les « plus remarquables » quations issues de la gomtrie sont de type « hyperelliptique », c'est--dire qu'elles ont pour degr p^{2n} avec p premier et que leur groupe est, dans les termes du *Trait*, « ablien ». Le groupe ablien (de taille $2n$, modulo p) est dfini dans [34, p. 171] : il s'agit de l'ensemble des substitutions (inversibles) qui transforment la fonction $\varphi = x_1\eta_1 - y_1\xi_1 + \dots + x_n\eta_n - y_n\xi_n$ en un multiple d'elle-mme (modulo p) en agissant sur les variables $(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n)$ et $(\xi_1, \eta_1, \dots, \xi_n, \eta_n)$. En termes et notations modernes — Jordan n'a pas de notation standard pour ce groupe —, le groupe ablien est le produit semi-direct $\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbf{F}_p) \rtimes \mathbf{F}_p^*$. noter que dans la littrature secondaire, il est souvent crit que la dfinition de Jordan du groupe ablien coincide avec la dfinition actuelle de groupe symplectique $\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbf{F}_p)$, qui correspond aux substitutions laissant φ inchange.

49. [32].

50. Regardons le cas particulier des surfaces cubiques. Une droite d'quations $\begin{cases} x = \alpha z + \beta \\ y = \gamma z + \delta \end{cases}$ est incluse dans une surface cubique d'quation $F(x, y, z) = 0$ si, et seulement si $F(\alpha z + \beta, \gamma z + \delta, z) = 0$ pour tout z . Mais cette dernire quation peut galement s'crire sous la forme

$$f_3(\alpha, \beta, \gamma, \delta)z^3 + f_2(\alpha, \beta, \gamma, \delta)z^2 + f_1(\alpha, \beta, \gamma, \delta)z + f_0(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = 0,$$

cette équation X qui est étudiée par Jordan dans chacune des six situations que nous avons énumérées précédemment. Suivant la situation, elle est baptisée *équation aux vingt-sept droites*, *équation aux vingt-huit tangentes doubles*, etc. : ce sont là les *équations de la géométrie*.

Pour étudier l'équation X , le point essentiel de la méthode de Jordan est de se baser sur des propriétés connues d'alignement, d'incidence ou d'appartenance des objets représentés par ses solutions. Pour les vingt-sept droites par exemple, Jordan cite Steiner⁵¹ au début du §V pour rappeler :

« Toute surface du troisième degré contient vingt-sept droites ;

L'une quelconque d'entre elles, a , en rencontre dix autres, se coupant elles-mêmes deux à deux, et formant ainsi avec a cinq triangles. Le nombre total des triangles ainsi formés sur la surface par les vingt-sept droites est de quarante-cinq ;

Si deux triangles abc , $a'b'c'$ n'ont aucun côté commun, on peut leur en associer un troisième $a''b''c''$ tel, que les côtés correspondants de ces trois triangles se coupent, et forment trois nouveaux triangles $aa'a''$, $bb'b''$, $cc'c''$. » [34, p. 316]

Pour les autres situations, les propriétés données sont analogues. Par exemple, pour les neuf points des courbes cubiques planes, Jordan rappelle qu'ils sont « situés trois à trois sur douze droites, qui s'y coupent quatre à quatre ».

De façon générale, ces propriétés permettent à Jordan d'introduire une fonction φ des racines de X dont le groupe⁵² contient celui de X . Ce dernier point est détaillé dans le *Traité* dans le cas des points d'inflexion d'une cubique plane. Il l'est également dans l'article du *Journal de Liouville* consacré à l'équation aux vingt-sept droites que nous avons mentionné précédemment. Regardons ce qu'y fait Jordan.

Jordan note les vingt-sept droites $a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, p, q, r, s, t, u, m', n', p', q', r', s', t', u'$ et établit la liste des quarante-cinq triangles grâce aux propriétés qu'il a rappelées :

$abc,$	$ade,$	$afg,$	$ahi,$	$akl,$	$bmn,$	$bpq,$	$brs,$	$btu,$
$cm'n',$	$cp'q',$	$cr's',$	$ct'u',$	$dmm',$	$dpp',$	$drr',$	$dt't',$	$enn',$
$eqq',$	$ess',$	$euu',$	$fmq',$	$fpn',$	$fst',$	$fur',$	$gnp',$	$gqm',$
$gru',$	$gts',$	$hms',$	$hrn',$	$hqt',$	$hup',$	$inr',$	$ism',$	$itq',$
$ipu',$	$kmu',$	$ktn',$	$kqr',$	$ksp',$	$lnt',$	$lum',$	$lrq',$	$lps'.$

Notant par la même lettre une droite et la racine qui lui correspond dans l'équation X , il introduit alors⁵³

$$\varphi = abc + ade + \dots + lps',$$

dont le groupe G contient le groupe de l'équation aux vingt-sept droites. En effet, le fait que les droites a, b, c forment un triangle s'exprime, selon Jordan, par un

où chaque f_i est un polynôme de degré 3 en $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. L'inclusion de la droite dans la surface équivaut donc au système

$$\begin{cases} f_3(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = 0 \\ f_2(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = 0 \\ f_1(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = 0 \\ f_0(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = 0. \end{cases}$$

C'est le système annoncé par Jordan — probablement en tout cas, puisqu'il n'en dit rien. L'équation aux vingt-sept droites obtenue en éliminant β, γ et δ est de degré 27 en α . À chaque solution α de cette équation, correspond un triplet (β, γ, δ) et donc une droite incluse dans la surface. Voir [49, p. 347].

51. Jordan réfère à [63], mais ajoute dans la note D située à la fin du *Traité* que Cayley et Salmon avaient découvert les vingt-sept droites avant Steiner. Cette note a été ajoutée suite à une remarque dans une lettre de Cremona à Jordan, qui lui précisait cette paternité.

52. C'est-à-dire le groupe des substitutions des racines de X qui fixent φ .

53. Ainsi, dans l'expression de φ , le symbole abc représente le produit des trois racines a, b et c de l'équation aux vingt-sept droites qui correspondent aux trois droites a, b et c .

systme de « relations analytiques »⁵⁴

$$\psi(a, b, c) = 0, \quad \chi(a, b, c) = 0, \dots$$

Si maintenant S est une substitution de G et si a' , b' et c' sont les racines qu'elle fait succder a , b , c , alors, puisque $\psi, \chi, \dots$ sont rationnelles en a, b, c ,

$$\psi(a', b', c') = 0, \quad \chi(a', b', c') = 0, \dots,$$

ce qui prouve que a' , b' et c' forment un triangle, et donc que le terme $a'b'c'$ apparat dans φ . Cela montre donc que le groupe de l'quation aux vingt-sept droites est contenu dans le groupe G de φ .

L'inclusion rciproque de ces groupes est, d'aprs Jordan, vraie lorsque toutes les « relations gomtriques » de la configuration dcoulent de celles considres :

« Rciproquement, si l'on admet que toutes les relations gomtriques existant entre les vingt-sept droites peuvent se dduire de celles qui prcdent, ce qui est au moins fort probable, G contiendra toutes les substitutions qui n'altrent pas φ ». [32]

Il admet alors que c'est le cas. Ce problme de l'inclusion rciproque n'est pas spcifique la configuration des vingt-sept droites, puisque Jordan crit de faon gnrale :

« Rciproquement, si l'on tait certain de connatre *toutes* les relations gomtriques que prsente la question propose (ou du moins celles dont les autres drivent), le groupe de l'quation X contiendrait toutes les substitutions du groupe de φ . Mais une semblable certitude est difficile obtenir, malgr le soin apport par d'habiles gomtres l'tude de ces problmes. Il ne serait donc pas impossible que les quations auxquelles ces problmes donnent naissance eussent parfois une forme plus particulire encore que celle que nous allons trouver, en nous appuyant sur les rsultats obtenus par nos prdcesseurs. » [34, p. 301]

Ainsi, pour chacune des situations gomtriques du *Traite*, Jordan exhibe une fonction φ et montre que le groupe de l'quation en question est inclus dans celui de φ . Soulignons que cette fonction φ est une sorte de trait d'union entre gomtrie et algbre : c'est par elle que l'information gomtrique (alignement, incidence...) s'incarne en information algbrique (une fonction des racines de l'quation sur laquelle peuvent agir les substitutions du groupe de cette quation). Ce sont ensuite les groupes de ces fonctions φ qui sont tudis par Jordan ; ils ne sont donc *a priori* pas gaux ceux des quations gomtriques. Cela n'empche pas Jordan de considrer que les groupes des fonctions φ sont vraiment ceux des quations correspondantes⁵⁵.

Dans son livre sur l'histoire de l'algbre, Bartel Leendert van der Waerden souligne cette lacune, dans le cas des vingt-sept droites uniquement. Il propose une

54. Nous changeons lgrement la notation de Jordan, qui fait un double emploi de la lettre φ . Les relations en question doivent exprimer que les droites a, b et c sont coplanaires. Par exemple, si a (resp. b) est donne comme intersection de deux plans A et B (resp. C et D) d'quations $Ax + A'y + A''z + A'''w = 0$, etc., alors la coplanarit de a et b se traduit par l'quation

$$\begin{vmatrix} A & A' & A'' & A''' \\ B & B' & B'' & B''' \\ C & C' & C'' & C''' \\ D & D' & D'' & D''' \end{vmatrix} = 0.$$

Or, les coordonnes de la droite a sont justement des quotients de $A, A', \dots, B'''$ (voir par exemple [58, p. 24]). La coplanarit de deux droites se traduit donc par une quation rationnelle en les coordonnes de ces droites. Enfin, pour chaque droite, trois de ses coordonnes s'expriment rationnellement en fonction de la quatrime, qui est solution de l'quation X .

55. Voir par exemple la Note sur les quations de la gomtrie [33].

démonstration permettant, dans ce cas-là, de prouver l'inclusion réciproque, c'est-à-dire que le groupe de l'équation aux vingt-sept droites est effectivement le groupe de la fonction φ ⁵⁶.

Laissons ce problème de côté et regardons ce que fait Jordan sur l'équation aux vingt-sept droites. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le vif du sujet, nous en profitons pour commenter un petit peu le type de démonstrations qui vont suivre. La généralité y passe souvent par des procédés de particularisation, que ce soit par des choix d'objets (s'incarnant concrètement par un « pour fixer les idées ») ou par de longues énumérations de cas, parfois traités un à un, parfois laissés de côté parce qu'ils sont identiques à d'autres ou parce qu'une démonstration se trouvant ailleurs dans le *Traité* s'y adapte. En cela, elle reflètent bien l'esprit général des preuves du *Traité des substitutions*. On y voit en tout cas Jordan méticuleux et ne reculant pas devant le détail — même si l'on est loin de la suite du *Traité*, où « on le voit énumérer des congruences jusqu'au degré 12 000, dénombrer des types de groupes résolubles jusqu'au degré 1 000 000, ou s'excuser de ce qu'un calcul devienne un peu pénible quand le nombre sur lequel on opère a plus de mille milliards de chiffres⁵⁷ ! »

2.2. Groupe, ordre et facteurs de composition de l'équation aux vingt-sept droites. Jordan commence par déterminer l'ordre du groupe G . D'abord, il constate que les substitutions de G sont susceptibles de remplacer a par n'importe quelle racine de X . Ensuite, parmi les substitutions de G , celles qui ne déplacent pas a doivent nécessairement permuter entre eux les cinq termes de φ qui contiennent $a : abc, ade, afg, ahi, akl$. Donc elles sont susceptibles d'envoyer b sur b, c, d, e, f, g, h ou i , ce qui donne au plus 10 choix. Jordan continue ainsi : les substitutions de G qui fixent a et b fixent nécessairement c et sont susceptibles d'envoyer d sur d, e, f, g, h ou i , ce qui donne au plus 8 choix. Par le même type d'argument, il montre que les substitutions qui fixent a, b et d fixent nécessairement e et permutent entre elles les racines m, p, r, t , ce qui donne au plus 24 choix. Enfin, Jordan remarque que les substitutions qui fixent a, b, d, m, p, r et t fixent en fait toutes les racines. Il déduit de tout cela que l'ordre de G est au plus $27 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 24$.

Réciproquement, Jordan montre que l'ordre de G est au moins égal à ce nombre en exhibant six substitutions particulières qui permettent de réaliser chacune des substitutions décrites ci-dessus :

$$\begin{aligned} A &= (amu)(cnt)(gq'r')(is'p')(u'ld)(m'ek) \\ B &= (bhk)(cil)(pt'r')(ns'u')(p'tr)(n'su) \\ C &= (dhk)(eil)(m's'u')(pus)(n'r't')(qtr) \\ D &= (ghk)(fil)(n'u's')(mtr)(m't'r')(nus) \\ E &= (fhk)(gil)(p'r't')(ptr)(q's'u')(qsu) \\ F &= (hk)(il)(r't')(s'u')(rt)(su). \end{aligned}$$

Jordan précise sans le prouver que ces substitutions appartiennent bien à G ⁵⁸.

56. Voir [66, p. 128]. Pour cette fameuse inclusion réciproque, van der Waerden commence par déterminer l'ordre du groupe des vingt-huit tangentes doubles d'une courbe quartique. Il en déduit ensuite, grâce aux travaux de Geiser (cf. 3.2.1), que l'ordre du groupe de l'équation aux vingt-sept droites est 51 840. Jordan ayant montré que l'ordre du groupe de φ est égal à ce nombre (cf. 2.2), il y a bien égalité entre le groupe de φ et le groupe de l'équation aux vingt-sept droites.

57. [44, p. LIV].

58. Vérifier ces appartenances est un peu fastidieux, mais pas difficile. Par exemple pour A : notant $1, 2, \dots, 45$ les termes de φ dans l'ordre où ils apparaissent, il est assez aisé de voir que A induit la permutation sur $\{1, \dots, 45\}$ définie par

$$\left(\begin{array}{cc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & 23 \\ 6 & 38 & 22 & 30 & 14 & 9 & 7 & 8 & 1 & 18 & 34 & 26 & 42 & 21 & 37 & 28 & 13 & 39 & 40 & 41 & 5 & 25 & 23 \\ \\ 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 33 & 34 & 35 & 36 & 37 & 38 & 39 & 40 & 41 & 42 & 43 & 44 & 45 \\ 24 & 3 & 36 & 19 & 44 & 11 & 33 & 31 & 32 & 4 & 29 & 20 & 12 & 45 & 43 & 10 & 27 & 35 & 17 & 2 & 16 & 15 \end{array} \right).$$

Toujours sans en donner les preuves, Jordan affirme que, combines entre elles, les substitutions A, B, C, D et E permettent d'envoyer a sur n'importe quelle autre racine; que B, C, D et E fixent a et peuvent envoyer b sur n'importe quelle des racines b, c, d, e, f, g, h ou i ; que C, D et E fixent a et b , et permettent d'envoyer d sur n'importe quelle des racines d, e, f, g, h, i, k, l ; que D et E fixent a, b et d , et permettent d'envoyer m et p sur deux quelconques racines parmi m, p, r, t ; enfin, que F permute r et t tout en fixant a, b, d, m, p . Cela lui permet de voir que G contient au moins $27 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 2$ substitutions⁵⁹.

Finalement, le groupe G est de cardinal $27 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 2$, et bien que Jordan ne le souligne pas, sa dmonstration montre bien entendu que G est driv⁶⁰ des substitutions A, B, C, D, E et F . Jordan continue en notant H le groupe driv de A, B, C, D et E . La dmonstration prcdente lui prouve que H est d'ordre au moins $27 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12$; il montre ensuite que H est d'ordre exactement ce nombre, qu'il est permutable toutes les substitutions de G ⁶¹ et que c'est un groupe simple. Voici comment il procde.

En ce qui concerne l'ordre de H , Jordan commence par remarquer que chaque substitution de G « quivaut un certain dplacement opr entre les termes de φ ». Les dplacements, ou substitutions, ainsi obtenus forment un groupe G_1 dont les lments correspondent un un ceux de G . Il y a dans G_1 un groupe partiel $\mathcal{S}_1$ form des substitutions rsultant d'un nombre pair de transpositions entre les termes de φ . Ce groupe partiel $\mathcal{S}_1$ est permutable aux substitutions de G_1 et il lui correspond un groupe partiel $\mathcal{S}$ dans G , permutable toutes les substitutions de celui-ci. Jordan affirme ensuite que les substitutions A, B, C, D et E quivalent toutes un nombre pair de transpositions⁶², et il en dduit que H est contenu dans $\mathcal{S}$. Mais F n'est pas dans $\mathcal{S}$ car elle quivaut un nombre impair de transpositions, ce qui donne la conclusion : $\mathcal{S}$ contient au plus la moiti des substitutions de G et contient H qui en contient exactement la moiti; par consquent $H = \mathcal{S}$ et en particulier leurs ordres sont gaux la moiti de l'ordre de G .

Rsumons ces derniers arguments avec un point de vue plus actuel. L'action de G sur les quarante-cinq termes de φ donne un isomorphisme

$$\Phi : G \subset \mathfrak{S}_{27} \xrightarrow{\sim} G_1 \subset \mathfrak{S}_{45}.$$

Le sous-groupe $\mathcal{S}_1 = G_1 \cap \mathfrak{A}_{45}$ est distingu dans G_1 car $\mathfrak{A}_{45}$ l'est dans $\mathfrak{S}_{45}$. Le sous-groupe $\mathcal{S} \stackrel{\text{df.}}{=} \Phi^{-1}(\mathcal{S}_1)$ est donc distingu dans G . On vrifie que $\Phi(A), \Phi(B), \dots, \Phi(E) \in \mathcal{S}_1$, ce qui implique que H , engendr par $A, \dots, E$, est inclus dans $\mathcal{S}$. De plus, comme $\Phi(F) \notin \mathcal{S}_1$, $F \notin \mathcal{S}$ et donc $(G : \mathcal{S}) \geq 2$, ce qui donne $\text{Card } \mathcal{S} \leq \frac{1}{2} \text{Card } G$. Mais $\text{Card } \mathcal{S} \geq \text{Card } H \geq 28 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 12 = \frac{1}{2} \text{Card } G$. Il vient donc $\text{Card } \mathcal{S} = \text{Card } H = \frac{1}{2} \text{Card } G$ et $\mathcal{S} = H$.

Jordan dtermine ensuite les facteurs de composition de G . Par construction de H , ceux-ci sont 2 ainsi que les facteurs de composition de H . Jordan montre alors que le groupe H est simple. Pour cette simplicit, nous nous contentons d'indiquer les ides de la dmonstration de Jordan. Dans le *Traite*, ce dernier renvoie en fait des paragraphes antrieurs o une situation analogue est traite; dans l'article

59. Nous avons vrifi chacun des points noncs ici, chaque fois dans un cas particulier. Par exemple, on peut voir que a peut tre envoy sur b par la substitution $BA^2D^2BE^2DA$; que b peut tre envoy sur c par BD^2EB^2 ; que d peut tre envoy sur e par C^2ED^2C ; que (m, p) peut tre envoy sur (p, t) par D^2ED .

60. En termes modernes : G est engendr par les substitutions A, B, C, D, E et F .

61. En termes modernes : H est distingu dans G .

62. Vrifions-le pour A . partir de l'criture de A donne la note 58, on obtient facilement la dcomposition de A en cycles :

$$\begin{aligned} A = & (1\ 6\ 9)(2\ 38\ 43)(3\ 22\ 25)(4\ 30\ 33)(5\ 14\ 21)(10\ 18\ 39)(11\ 34\ 29)(12\ 26\ 36) \\ & (13\ 42\ 17)(15\ 37\ 45)(16\ 28\ 44)(19\ 40\ 27)(20\ 41\ 35), \end{aligned}$$

qui montre que A est effectivement une permutation paire.

du *Journal de Liouville*, la preuve est donnée intégralement. L'idée est la suivante : si I est un groupe (différent de $\{1\}$) contenu dans H et permutable à toutes ses substitutions, Jordan montre que I contient

- 1° une substitution qui fixe a ,
- 2° une substitution qui fixe a et b ,
- 3° une substitution qui fixe a , b et d ,
- 4° la substitution E ,
- 5° les substitutions A , B , C , D et E .

Donnons en termes modernes les grandes lignes de la preuve du point 1° ; celles des autres points sont du même acabit. Soit $S \in I \setminus \{1\}$ qui envoie a sur, par exemple, b . Si parmi C , D , E , il y en a une, disons T , qui ne commute pas avec S , alors I contient $S^{-1} \cdot T^{-1}ST \neq 1$ qui envoie a sur lui-même : c'est gagné. Sinon, S permute entre elles les racines a , b , c d'une part et les racines m , n d'autre part. Donc, si S ne fixe aucune racine, elle permute circulairement a , b , c d'une part et m , n d'autre part. En particulier, $S^2 \neq 1$ et S^2 fixe m et n . Or, il existe $\Sigma \in H$ telle que $S\Sigma = a$. Alors I contient $\Sigma^{-1}S^2\Sigma$ qui fixe a .

Comme H est dérivé de cinq substitutions A , B , C , D , E , le point 5° implique que I est égal à H et donc que H est simple. À l'issue des indications de cette preuve, Jordan précise dans le *Traité* :

« Nous nous bornons à indiquer ce procédé direct de démonstration, la proposition à établir devant se retrouver plus loin (504). »

Le numéro auquel Jordan fait référence est celui qui conclut son travail sur les équations liées aux fonctions hyperelliptiques. Il y montre d'une part que le groupe de l'équation de la trisection des périodes de ces fonctions est égal au groupe abélien $\mathrm{Sp}_4(\mathbf{F}_3) \rtimes \mathbf{F}_3^*$ (cf. note 48), et d'autre part qu'il est identique, après adjonction d'une racine carrée, à celui de l'équation aux vingt-sept droites, $\mathrm{Sp}_4(\mathbf{F}_3)$. Or, il a également montré lors de son étude générale du groupe abélien que le groupe (en termes et notation modernes) $\mathrm{PSp}_4(\mathbf{F}_3) = \mathrm{Sp}_4(\mathbf{F}_3)/\{\pm I_4\}$ est simple⁶³ : mais ce dernier est justement le groupe H dont il est question ici.

Résumons : pour le moment, Jordan a montré que le groupe G de la fonction φ est d'ordre $27 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 24 (= 51\,840)$, qu'il possède un sous-groupe H d'indice 2 qui est simple, et donc que les facteurs de composition de G sont 2 et $\frac{\mathrm{Card} G}{2}$.

2.3. Réduites géométriques de l'équation aux vingt-sept droites. Le reste du paragraphe sur l'équation aux vingt-sept droites est consacré à la recherche de réduites de cette équation. Jordan commence par donner « plusieurs réduites remarquables, signalées par divers géomètres ». Pour la première de ces réduites, il explique :

« Prenons, par exemple, pour inconnue de la question le plan⁶⁴ du triangle formé par trois droites qui se coupent : ces triangles étant au nombre de quarante-cinq, on aura une équation du quarante-cinquième degré, équivalente à la proposée ». [34, p. 319]

De façon analogue, Jordan donne deux autres réduites, l'une de degré 40 correspondant aux triplets de doubles trièdres, l'autre de degré 36 correspondant aux doubles-six (voir nos rappels en 1.1). Pour fixer les idées, citons encore Jordan pour le cas des doubles-six :

« On peut déterminer de $\frac{27 \cdot 16}{2}$ manières différentes une paire de droites qui ne se coupent pas. On peut d'ailleurs grouper ces paires

63. [34, p. 176].

64. Rappelons qu'un tel plan est appelé *plan tangent triple* par Cayley et Salmon en particulier. Voir [5].

six six (*doubles-six* de Schfli), de sorte que les droites d’une paire rencontrent chacune une droite de chaque autre paire du double-six.

Les doubles-six dpendent donc d’une quation du degr $\frac{27 \cdot 16}{2 \cdot 6} = 36$, qui sera encore quivalente la propose. » [34, p. 319]

La lecture de ces lignes, que Jordan n’explique pas d’avantage, soulve deux questions. D’abord, quelles sont ces quations dont dpendent les plans des triangles, les triplets de doubles tridres et les doubles-six ? Ensuite, d’o provient leur quivalence annonce avec l’quation aux vingt-sept droites ? Nous avons vu que Jordan a pris soin d’expliquer le processus de formation des quations aux vingt-sept droites, aux neuf points d’inflexion, etc. : l’inconnue de l’quation — obtenue par limination — tait un paramtre reprsentant une droite, un point, etc. Ici, s’il est encore possible de former de telle sorte une quation donnant les 45 plans, il semble plus difficile de former celle des 36 doubles-six, puisqu’un double-six est dfini par des relations d’incidence *et de non incidence*.

La faon qu’a Jordan de formuler ses affirmations laisse plutt supposer que l’quation des 45 plans (par exemple) est une quation abstraite de degr 45, dont les racines sont des symboles reprsentant chaque plan et soumis des relations traduisant les relations d’incidence particulires connues entre ces plans. L’quivalence entre cette quation et celle des vingt-sept droites proviendrait alors du fait que la connaissance des vingt-sept droites et de leurs relations d’incidence entrane celle des plans, et que rciproquement, la connaissance des plans et de leurs relations d’incidence entrane celle des vingt-sept droites : les 45 plans se coupent cinq cinq suivant une des droites de la surface cubique.

Cette interprtation s’applique aussi aux cas des tridres et des doubles-six, car on peut retrouver une une chacune des vingt-sept droites par un jeu d’intersection des tridres ou des doubles-six entre eux. En outre, la phrase de Jordan que nous avons dj cite en partie :

« L’quation aux vingt-sept droites a plusieurs rduites remarquables, signales par divers gomtres » [34, p. 319]

semble maintenant confirmer nos propos. En effet, d’aprs la littrature secondaire⁶⁵, Jordan est le premier s’intresser l’quation aux vingt-sept droites, et en particulier, personne avant lui n’en a donn de rduite. C’est donc que la connaissance gomtrique de configurations particulires (triangles, tridres, doubles-six) donne, de faon en quelque sorte automatique, des rduites de degr correspondant au nombre d’objets constituant ces configurations.

Cette vision des choses tranche assez franchement avec le reste du *Traite*. Sachant l’influence de Clebsch sur l’criture du chapitre des applications gomtriques, il est plus que tentant de voir les « librales communications » (cf. note 44) de celui-ci en filigrane. De fait, ce type de raisonnement se retrouve dans plusieurs travaux de Clebsch, o l’existence de groupements de droites implique sans dtour l’existence de certaines rduites. Par exemple, dans le cas des seize droites d’une surface quartique conique double dont nous reparlerons dans la suite, Clebsch montre qu’il y a 5 manres de les regrouper deux deux (selon certaines proprits d’incidence) et en dduit immdiatement l’existence d’une rduite de degr 5 pour l’quation aux seize droites⁶⁶. Ce raisonnement bas sur une connaissance de la situation gomtrique sous-jacente l’quation tudie coincide donc avec celle l’uvre dans les lignes de Jordan.

Ce dernier la rutilise *a contrario* dans la suite du *Traite* :

« Aucune rduite d’un degr infrieur au vingt-septime n’ayant t rencontre jusqu’ici, on tait fond penser qu’il est impossible de

65. [28, 48].

66. Voir [9, p. 19].

ramener la résolution de l'équation aux vingt-sept droites à celle d'une équation d'un degré inférieur. Nous allons en effet prouver cette proposition. » [34, p. 319]

Ainsi, Jordan utilise à nouveau les connaissances géométriques connues pour avancer dans son étude de l'équation aux vingt-sept droites ; mais cette fois, c'est en se basant sur le fait qu'aucune configuration de moins de vingt-sept objets formés à partir des vingt-sept droites n'a été mise à jour qu'il conjecture la non existence de réduite de degré inférieur à 27. Comme nous allons le voir à présent, il confirme cela avec une preuve fondée sur des considérations d'équations et de substitutions, et totalement exemptée de géométrie.

2.4. Il n'existe pas de réduite de degré inférieur à 27. Pour montrer que l'équation aux vingt-sept droites ne possède pas de réduite de degré strictement inférieur à 27, Jordan commence par faire remarquer que si un tel abaissement avait lieu, il aurait lieu aussi après avoir adjoint la racine carrée réduisant le groupe G à H ⁶⁷. Il suppose que cette adjonction est faite et cherche quels sont les degrés possibles pour l'équation réduite.

Jordan note E_{27} l'équation aux vingt-sept droites et E_d une équation équivalente à E_{27} , de degré d minimal parmi celles-ci. Il montre par l'absurde que E_d est irréductible et primitive : si E_d n'était pas irréductible, la résolution d'un de ses facteurs (de degré inférieur à d) abaisserait le groupe de E_{27} . Mais comme H , groupe de E_{27} , est simple, la résolution d'un tel facteur entraînerait la résolution complète de E_{27} d'après le COROLLAIRE que nous avons rappelé à la section 1.2. Comme réciproquement, toutes les racines de E_d , donc celles de ses facteurs irréductibles, sont des fonctions rationnelles de celles de E_{27} , cela implique que E_{27} est équivalente à un facteur de E_d , ce qui contredit la minimalité de d .

Si d'autre part l'équation E_d n'était pas primitive, ses racines se regrouperaient en systèmes « dépendant d'une équation dont le degré divise d ». La résolution de cette équation abaisserait le groupe de E_{27} ⁶⁸ et donc entraînerait comme *supra* la résolution de E_{27} , contredisant à nouveau la minimalité de d .

Jordan note alors G_d l'ordre⁶⁹ de E_d : puisque E_d et E_{27} sont équivalentes, G_d est égal à l'ordre de E_{27} , qui est $\Omega = 27 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 2$. En outre, G_d est divisible par d et divise⁷⁰ $1 \cdot 2 \dots d$. Jordan en conclut que si $d < 27$, alors d est l'un des nombres 24, 20, 18, 16, 15, 12, 10 et 9. Il écarte ensuite ces différentes possibilités au fur et à mesure, au cours de longs développements. Nous ne donnons ici que la preuve que le cas $d = 24$ est impossible. D'une part, comme Jordan l'écrit, il s'adapte aux cas $d = 18$ et $d = 12$, et d'autre part, il est représentatif de l'esprit des autres cas. La démonstration de Jordan devenant ici très elliptique, nous choisissons d'intervenir ligne par ligne pour donner des compléments et des explications en termes modernes. Nous introduisons également une numérotation afin de rendre plus aisée la lecture de ce qui suit.

- (1) Jordan suppose l'existence d'une réduite E_{24} de degré 24. « Adjoignons à l'équation E_{24} une de ses racines, x : l'équation E_{23} qui détermine les vingt-trois

67. Rappelons en effet que l'indice de H dans G est 2. Donc, si K désigne un corps de décomposition de l'équation aux vingt-sept droites, et si k' désigne la sous-extension de K/k telle que $\text{Gal}(K/k') = H$, on a $[k' : k] = 2$. C'est justement dire qu'il existe un élément δ de degré 2 sur k (la « racine carrée ») tel que $k' = k(\delta)$.

68. Il s'agit d'un théorème général sur la résolution des équations non primitives. Voir par exemple [35, p. 31].

69. Nous adoptons la terminologie de Jordan qui désigne par « ordre d'une équation » l'ordre de son groupe.

70. Le fait que G_d divise $d!$ vient du fait que G_d est un sous-groupe de $\mathfrak{S}_d$. Le fait que G_d soit divisible par d s'explique de la façon suivante : si on note $x_1, \dots, x_d$ les racines de E_d , alors $G_d = [k(x_1, \dots, x_d) : k]$. Mais $[k(x_1, \dots, x_d) : k] = [k(x_1, \dots, x_d) : k(x_1)][k(x_1) : k]$, et comme E_d est irréductible, $k(x_1) \simeq k[X]/(E_d)$ est de degré d sur k .

racines restantes a son groupe G_{23} form des substitutions qui laissent x immobile, et son ordre est gal $\Omega/24$, nombre divisible par les nombres premiers 2, 3, [5]⁷¹. »

Par correspondance de Galois, le groupe G_{23} de E_{23} est effectivement le stabilisateur $\text{Stab}_{G_{24}}(x)$ de x sous G_{24} . De plus, comme E_{24} est irrductible, son groupe G_{24} est transitif d'aprs le THOREME II que nous avons rappel en section 1.2. Par consquent, l'orbite $G_{24} \cdot x$ est de cardinal maximal, c'est--dire 24. Ainsi,

$$\#G_{23} = \# \text{Stab}_{G_{24}}(x) = \frac{\#G_{24}}{\#G_{24} \cdot x} = \frac{\Omega}{24}.$$

Le nombre $\Omega/24$ est bien divisible par 2, 3 et 5 ; ce sont d'ailleurs ses seuls facteurs premiers.

- (2) « Les quations irrductibles dont elle est le produit ont donc leur ordre divisible par ces trois nombres premiers, l'exclusion de tous les autres (397). »

Le thorme donn au numro 397 du *Trait* dit en effet que si $\mathcal{E}$ est une quation irrductible et primitive de degr n et E une quation de degr $n - 1$ obtenue en adjoignant $\mathcal{E}$ une de ses racines, tout nombre premier qui divise l'ordre de E divise l'ordre de chacune de ses quations partielles (c'est--dire de ses facteurs). Appliqu ici, cela implique que l'ordre des facteurs irrductibles de E_{23} est divisible par 2, 3 et 5. Rciproquement, tout diviseur de l'ordre d'une quation partielle divise l'ordre de l'quation car le groupe de l'quation partielle est un sous-groupe de celui de l'quation « globale ». Ici, 2, 3 et 5 sont les seuls diviseurs premiers de $\Omega/24$, ce qui permet Jordan d'exclure des diviseurs des ordres des quations partielles les nombres premiers autres que 2, 3 et 5.

- (3) « Donc chacune de ces quations est du degr 5 au moins ; en outre, aucune d'elles n'a pour degr 7, 8 ou 9, car son ordre ne pourrait tre divisible par 5 sans l'tre par 7 (398) ».

Le thorme donn au numro 398 dit que si une quation irrductible E de degr n a son ordre divisible par un nombre premier p suprieur $n/2$, son groupe sera $n - p + 1$ fois transitif. Dans la situation prsente, supposons par exemple qu'un facteur irrductible soit de degr 8 et notons-en $x_1, \dots, x_8$ les racines. Par le thorme 398 appliqu avec $n = 8$ et $p = 5$, son groupe Γ est 3 fois transitif. Notons $\text{Stab}_{\Gamma}(x_1, x_2) = \{g \in \Gamma, gx_1 = x_1 \text{ et } gx_2 = x_2\}$. Ce groupe s'interprte comme le stabilisateur de x_2 sous $\text{Stab}_{\Gamma}(x_1)$, donc

$$\# \text{Stab}_{\Gamma}(x_1, x_2) = \frac{\# \text{Stab}_{\Gamma}(x_1)}{\# \text{Stab}_{\Gamma}(x_1) \cdot x_2}.$$

Mais $\text{Stab}_{\Gamma}(x_1) \cdot x_2$ est de cardinal 7 car, comme G est 3 fois donc 2 fois transitif, on peut envoyer (x_1, x_2) sur n'importe quel couple (x_1, ξ) avec $\xi \in \{x_2, \dots, x_8\}$. Donc

$$\# \text{Stab}_{\Gamma}(x_1, x_2) = \frac{1}{7} \# \text{Stab}_{\Gamma}(x_1) = \frac{1}{7} \cdot \frac{\#\Gamma}{8},$$

la dernire galit provenant comme au point 1 de la transitivit de Γ . De cela suit que $\#\Gamma$ est divisible par 7.

- (4) « Enfin, aucune d'elles n'a son degr divisible par un nombre premier autre que 2, 3, 5, car ce nombre premier diviserait son ordre. »

En effet, comme le degr d'une quation divise son ordre (voir la note 70), tout diviseur premier du degr divise galement l'ordre de l'quation.

71. Coquille dans le *Trait*, o il est crit « 2, 3, 4 ».

- (5) « D'après cela, les seules hypothèses admissibles pour les degrés de ces facteurs irréductibles sont les suivantes : 18 et 5 ; 12, 6 et 5 ; 6, 6, 6, et 5. »

On énumère les possibilités : on cherche les degrés sous la forme $2^\alpha 3^\beta 5^\gamma$ et leur somme doit être égale à 23. Parmi les nombres de la forme annoncée, ceux qui sont inférieurs à 23 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18 et 20. On exclut déjà 1, 2, 3, 4, 8 et 9 vu le point 3. Faire la liste des partitions de 23 avec les nombres de la liste restants donne ce que Jordan annonce.

- (6) Jordan montre que la première hypothèse est impossible, les mêmes raisonnements montrant que les autres hypothèses le sont tout autant : « Supposons que E_{23} soit le produit de deux facteurs E_{18} et E_5 ayant respectivement pour racines $y_1, \dots, y_{18}$ et $x_1, \dots, x_5$. L'ordre du groupe partiel $\Gamma^{(\mu)}$ formé par les substitutions de G_{24} qui laissent immobiles x et x_μ sera $\frac{\Omega}{24 \cdot 5}$ et celui du groupe partiel $\Delta^{(\nu)}$ formé par celles des substitutions qui laissent immobiles x et y_ν sera $\frac{\Omega}{24 \cdot 18}$. »

Il est bon de commencer par rappeler le fait suivant (qui apparaît un peu caché dans le numéro 357 du *Traité*) : soit F un facteur d'une équation E . Alors tout élément du groupe de Galois de E induit une permutation des racines de F . Donc ici, les racines $x_1, \dots, x_5$ sont permutées entre elles, de même que les racines $y_1, \dots, y_{18}$. Comme E_5 est irréductible, l'action induite est transitive et on en déduit comme au point 3 que

$$\#\Gamma^{(\mu)} = \frac{\#\text{Stab}_{G_{24}}(x)}{\#\text{Stab}_{G_{24}}(x) \cdot x_\mu} = \frac{\Omega/24}{5}.$$

De même pour $\#\Delta^{(\nu)}$.

- (7) « Soit maintenant S une substitution de G_{24} , qui remplace x par x_μ , et soient z une autre racine quelconque de E_{24} , u la racine que S lui fait succéder. Le groupe formé par les substitutions qui laissent x_μ et u immobiles est le transformé par S de celui dont les substitutions laissent x et z immobiles ; il contiendra donc $\frac{\Omega}{24 \cdot 5}$ ou $\frac{\Omega}{24 \cdot 18}$ substitutions, suivant que z sera l'une des racines $x_1, \dots, x_5$ ou l'une des racines $y_1, \dots, y_{18}$. »

Par définition, le transformé de $\text{Stab}(x, z)$ par S est le groupe $S \cdot \text{Stab}(x, z) \cdot S^{-1}$ (voir [34, p. 24] ; à remarquer que Jordan note la composition de deux substitutions dans l'ordre inverse de celui que nous avons l'habitude d'utiliser de nos jours). Ces assertions de Jordan dont il est question ici ne posent pas de difficulté.

- (8) « Or l'équation E_5 ayant son ordre divisible par 3, son groupe est trois fois transitif (398) ; donc le groupe formé par celles des substitutions de G_{23} qui laissent immobiles deux quelconques de ses racines x_μ et $x_{\mu'}$, a pour ordre $\frac{\Omega}{24 \cdot 5 \cdot 4}$. »

La démonstration est la même qu'au point 3, où a d'ailleurs été rappelé le théorème du n° 398.

- (9) « Le groupe formé par celles des substitutions de G_{24} qui jouissent de cette propriété, contenant celui-là, a pour ordre un multiple de ce nombre ; donc il ne peut avoir pour ordre $\frac{\Omega}{24 \cdot 18}$; donc les cinq racines telles, que le groupe partiel formé par celles des substitutions de G_{24} qui laissent immobiles l'une d'elles en même temps que x_μ ait pour ordre $\frac{\Omega}{24 \cdot 5}$, sont $x, x_1, \dots, x_{\mu-1}, x_{\mu+1}, \dots$. Mais S les fait succéder aux cinq racines $x_1, \dots, x_5$, qui jouissent de la même

proprit par rapport x . Donc S permute exclusivement entre elles les six racines $x, x_1, \dots, x_5$ ».

D'aprs le point 6, on a $\# \text{Stab}(x_\mu, x) = \frac{\Omega}{24 \cdot 5}$. Ensuite, d'aprs le point 7,

$$\# \text{Stab}(x_\mu, x_{\mu'}) = \begin{cases} \Omega/(24 \cdot 5) & \text{si } S^{-1}x_{\mu'} \in \{x_1, \dots, x_5\} \\ \Omega/(24 \cdot 18) & \text{si } S^{-1}x_{\mu'} \in \{y_1, \dots, y_{18}\}. \end{cases}$$

D'aprs le dbut de ce point 9, le second cas est exclu, et donc $\# \text{Stab}(x_\mu, x_{\mu'}) = \frac{\Omega}{24 \cdot 5}$ et $S^{-1}x_{\mu'} \in \{x_1, \dots, x_5\}$. Ce dernier fait, joint l'galit $Sx = x_\mu$, montre alors que S permute entre elles $x, x_1, \dots, x_\mu$. Par consquent, on a ncessairement $S^{-1}y_\nu \in \{y_1, \dots, y_{18}\}$ pour tout ν et donc $\# \text{Stab}(x_\mu, y_\nu) = \frac{\Omega}{24 \cdot 18}$, ce qui finit de prouver ce que Jordan annonce.

- (10) « D'o l'on [dduit] comme au n 396, que E_{24} n'est pas primitive, ce qui est contraire au numro prcdent. »

Donnons les grandes lignes de la preuve du n 396, qui s'adapte telle quelle la situation prsente. Si une substitution de G_{24} envoie une des racines $x, x_1, \dots, x_5$ sur une autre de cet ensemble, alors elle permute ces six racines exclusivement entre elles. Soit $y \in \{y_1, \dots, y_{18}\}$ et $U \in G_{24}$ telle que $Ux = y$. Alors $y = Ux, \eta_1 = Ux_1, \dots, \eta_5 = Ux_5$ sont toutes diffrentes de $x, x_1, \dots, x_5$ et toute substitution envoyant une des racines du premier ensemble sur une racine du second ensemble envoie *toutes* les racines du premier ensemble sur celles du second. On obtient de mme un troisime ensemble de six racines $\eta', \eta'_1, \dots, \eta'_5$. Cette partition des racines de E_{24} en trois ensembles montre que E_{24} n'est pas primitive.

Jordan a ainsi prouv que l'quation aux vingt-sept droites ne possde pas de rduite de degr $d = 24$. Avec le mme genre de techniques, il montre que les autres possibilits pour d mnent des contradictions. Comme l'crit Jean Dieudonn, cette dmonstration est une « longue et dlicate analyse »⁷²; c'est d'ailleurs la plus longue de toutes celles des « Applications Gomtriques » du *Traitt*.

Cette impossibilit d'« abaissement » de l'quation aux vingt-sept droites conclut l'article du *Journal de Liouville*, mais la section du *Traitt* sur les droites des surfaces cubiques contient encore un paragraphe concernant l'adjonction cette quation d'une de ses racines. Ce paragraphe consiste en l'nonc du rsultat liant le problme des vingt-sept droites celui des seize droites. Nous le regarderons un peu plus tard, conjointement celui liant les vingt-sept droites aux vingt-huit tangentes doubles. Auparavant, nous allons voir que la lecture des commentaires concernant ces rsultats nous renseigne dj sur l'articulation entre thorie des substitutions et gomtrie que nous tenons analyser.

3. DES VINGT-SEPT DROITES AUX SEIZE DROITES ET AUX VINGT-HUIT TANGENTES DOUBLES

 la fin de sa Note « Sur les quations de la gomtrie », Jordan crit que si l'on adjoint l'quation aux vingt-huit tangentes doubles une de ses racines, on obtient une quation de degr 27 ayant le mme groupe que l'quation aux vingt-sept droites; puis que si l'on adjoint cette dernire une de ses racines, l'quation obtenue se dcompose en une quation de degr 10 et une autre de degr 16, ayant mme groupe que l'quation aux seize droites.

La rduction de l'quation aux vingt-huit tangentes doubles celle des vingt-sept droites est faite dans le paragraphe VI du *Traitt des substitutions*. Jordan y commente son rsultat :

⁷². [36, p. xxiii].

« Ainsi se retrouve entre le problème des vingt-sept droites et celui des doubles tangentes, le lien remarquable signalé par M. Geiser. » [34, p. 330]

Le lecteur est alors renvoyé à un article de Geiser⁷³, consacré aux vingt-huit tangentes doubles des quartiques planes. Cet article est également cité dans la Note « Sur les équations de la géométrie », à l'issue de la remarque suivante :

« La théorie des substitutions aurait donc permis de prévoir l'existence des liaisons géométriques qui existent entre les problèmes des vingt-huit doubles tangentes, des vingt-sept droites et des seize droites ». [33]

Concernant les seize droites, Jordan écrit de même dans sa Notice destinée à sa candidature à l'Académie des Sciences :

« [L'équation des vingt-sept droites] est intimement liée à l'équation des seize droites. Ce dernier résultat, que la théorie m'avait fait prévoir, a été vérifié par M. Geiser. » [35, p. 32]

Et l'article de Geiser consacré aux surfaces quartiques à conique double et leur seize droites⁷⁴, est introduit comme suit :

« La relation vue dans le mémoire “Ueber die Doppeltangenten einer ebenen Curve vierten Grades” entre les droites des surfaces du troisième degré et les tangentes doubles des courbes planes du quatrième degré a incité Monsieur *Camille Jordan* à effectuer des recherches algébriques, lesquelles, comme ce dernier l'a brièvement partagé avec l'auteur, font voir un rapport entre les droites d'une surface générale du troisième degré et les droites d'une surface du quatrième degré avec courbe plane double du second degré. En effet, les considérations géométriques suivantes confirment les suppositions annoncées par Monsieur *Jordan*⁷⁵. » [22].

Tous les propos rapportés ici mettent en lumière une relation complexe entre théorie des substitutions et géométrie.

On voit en effet que Jordan et Geiser ont tendance à bien démarquer leurs approches respectives : d'une part les travaux algébriques de Jordan, et d'autre part les travaux géométriques de Geiser. La séparation entre les approches est donc nette, mais elle n'empêche pas un enrichissement mutuel de chacune par l'autre, puisque les découvertes de Geiser sur les liens entre les tangentes doubles et les vingt-sept droites inspirent à Jordan ses travaux sur les équations, qui eux-mêmes font faire à Geiser ses travaux sur les seize droites.

La démarcation entre théorie des substitutions et géométrie se lit également dans les mots employés par ces deux protagonistes. Du côté de l'algèbre, Jordan écrit que c'est une « théorie » permettant de « prévoir » des résultats et Geiser parle des « suppositions annoncées par Monsieur *Jordan* ». De l'autre côté, les considérations géométriques permettent, selon les deux auteurs, de « vérifier » ou de « confirmer »⁷⁶ ce qui a été vu par l'algèbre. La situation n'est donc pas symétrique entre les deux disciplines : la théorie des substitutions semble être d'avantage un moyen de deviner

73. [21].

74. [22].

75. Die in dem Aufsatz : “Ueber die Doppeltangenten einer ebenen Curve vierten Grades” [21] nachgewiesene Beziehung zwischen den Geraden der Fläche dritten Grades und die Doppeltangenten der Curve vierten Grades haben Herrn *Camille Jordan* zu algebraischen Untersuchungen veranlasst [33], die, wie er dem Verfasser brieflich mittheilte, einen Zusammenhang erkennen lassen zwischen den Geraden einer allgemeiner Fläche dritten Grades und den Geraden einer Fläche vierten Grades, welche eine ebene Doppelpunktcurve zweiten Grades hat. In der That bestätigen die nachfolgenden geometrischen Betrachtungen die von Herrn *Jordan* ausgesprochene Vermuthung. »

76. À la fin de [22], Geiser emploie à nouveau le même vocabulaire : « [...] dieser Aufsatz], dessen Grundgedanke in der Bestätigung der von Herrn *Jordan* ausgesprochene Vermuthung liegt. »

des rsultats gomtriques (ici, les liens entre les trois configurations de droites), rsultats devant tre prouvs par la gomtrie. D'ailleurs, l'emploi du conditionnel pass dans la deuxime des citations de Jordan que nous avons rapportes dans cette section laisse entendre que Jordan accorde une potentialit d'anticipation de la thorie des substitutions, au moins face la gomtrie. S'il semble un peu risqu d'extrapoler partir de ces quelques phrases un point de vue gnral de Jordan et de Geiser sur une quelconque hirarchie entre algbre et gomtrie, nul doute que ces champs lexicaux particuliers mettent en vidence une relle diffrence de statut entre thorie des substitutions et gomtrie.

Avant d'aller plus en avant sur ce terrain, il nous semble utile de regarder en dtails les travaux de Jordan et de Geiser dont il est question ici, afin de se rendre compte de faon plus prcise ce que Geiser appelle « recherches algbriques » et « considrations gomtriques ».

3.1. Les « recherches algbriques » de Jordan. Nous regardons donc ici l'approche de Jordan concernant la lien entre les vingt-huit tangentes doubles, les vingt-sept droites et les seize droites. Nous revenons au *Traitt*, et plus spcifiquement au chapitre des applications gomtriques.

3.1.1. Les vingt-huit tangentes doubles. Rappelons-le, le §VI des « Applications gomtriques » du *Traitt* est consacr aux courbes d'ordre $n - 3$ qui sont tangentes en $n(n - 3)/2$ points une courbe C donne d'ordre n . Pour $n = 4$, il s'agit des tangentes doubles une courbe quartique donne. Contrairement Jordan, nous nous confinons ce cas pour les quelques rsultats qu'il nonce au dbut de ce §VI.

Jordan rappelle en citant [7], que l'quation dont dpendent les tangentes doubles est de degr 28. Ses racines peuvent tre reprsentes par le symbole $(x_1y_1x_2y_2x_3y_3)$, o $x_1, \dots, y_3$ valent 0 ou 1 et satisfont la condition

$$x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Citant toujours Clebsch, Jordan nonce le thorme suivant (il le fait dans le cas gnral d'une courbe de degr n ; nous l'appliquons directement $n = 4$) :

« Soit μ un entier quelconque tel, que $\mu/2$ soit entier : les points de contact de C avec les μ courbes correspondantes aux μ racines $(x'_1y'_1 \dots y'_3), \dots, (x_1^{(\mu)}y_1^{(\mu)} \dots y_3^{(\mu)})$ seront sur une mme courbe du degr $\mu/2$, lorsque les six congruences contenues dans les formules suivantes :

$$x'_\rho + \dots + x_\rho^{(\mu)} \equiv y'_\rho + \dots + y_\rho^{(\mu)} \equiv 0 \pmod{2}$$

sont satisfaites la fois [c'est--dire pour tout $\rho \in \{1, 2, 3\}$] ». [34, p. 329]

 nouveau, Jordan introduit une fonction φ_4 adquate ; ici, elle est obtenue en sommant tous les systmes de quatre racines vrifiant les conditions du thorme prcdent appliqu avec $\mu = 4$. En notation moderne,

$$\varphi_4 = \sum_{\substack{x_\rho + x'_\rho + x''_\rho + x'''_\rho \equiv 0 \\ y_\rho + y'_\rho + y''_\rho + y'''_\rho \equiv 0 \\ \forall \rho \in \{1, 2, 3\}}} (x_1y_1 \dots y_3)(x'_1y'_1 \dots y'_3)(x''_1y''_1 \dots y''_3)(x'''_1y'''_1 \dots y'''_3).$$

Comme dans les autres situations gomtriques, Jordan montre que le groupe de l'quation aux vingt-huit tangentes doubles est inclus dans le groupe G de la fonction φ_4 , et ne dit rien sur l'inclusion rciproque.

Il continue en regardant l'effet de l'adjonction l'quation aux vingt-huit tangentes doubles d'une de ses racines, par exemple (110000) : les racines restantes sont dtermines par une quation de degr 27 dont le groupe H est constitu des

substitutions de G qui fixent (110000). Ainsi, H laisse invariante la fonction φ'_4 formée des termes de φ_4 qui contiennent (110000) en facteur⁷⁷. Une nouvelle fonction ψ invariable par H est obtenue en omettant ce facteur ; elle est formée de la somme des produits de trois racines $(x_1, \dots, y_3), (x'_1, \dots, y'_3), (x''_1, \dots, y''_3)$ telles que⁷⁸

$$x_1 + x'_1 + x''_1 + 1 \equiv y_1 + y'_1 + y''_1 + 1 \equiv x_2 + x'_2 + x''_2 \equiv \dots \equiv y_3 + y'_3 + y''_3 \equiv 0 \pmod{2}.$$

Jordan écrit alors :

« Cela posé, il est aisé de voir que ψ contient quarante-cinq termes et ne diffère que par la notation de la fonction φ du n° 441 [celle des vingt-sept droites]. » [34, p. 330]

Cette vérification n'est en effet pas difficile, mais elle est assez fastidieuse. Il s'agit dans un premier temps d'établir la liste de tous les symboles de racines possibles : outre celle qu'on adjoint à l'équation, on en trouve 27 — cela correspond aux vingt-sept droites. On cherche ensuite quelles sont les combinaisons à former pour ψ — ces combinaisons correspondent aux triangles formés avec les vingt-sept droites. Nous ne détaillons pas tous ces calculs ici. La fonction ψ est de la forme

$$\psi = (000011)(000111)(110100) + (000011)(001011)(111000) + \dots$$

ce qui va effectivement correspondre à

$$\varphi = abc + ade + \dots$$

Jordan déduit de cette identité entre φ et ψ que le groupe des vingt-sept tangentes doubles est contenu dans celui des vingt-sept droites⁷⁹.

Pour montrer l'égalité des deux groupes, Jordan montre que leurs ordres sont égaux. En effet, Jordan a étudié dans le *Traité* ce qu'il appelle les « groupes de Steiner », dont le groupe des vingt-huit tangentes doubles est un cas particulier. Le cardinal de ce dernier est⁸⁰

$$\mathcal{R}_3(\mathcal{R}_3 - 1) 2^4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5,$$

où $\mathcal{R}_3 = 2^{2 \cdot 3 - 1} - 2^{3 - 1} = 28$. L'ordre du groupe des vingt-sept tangentes doubles est donc⁸¹ $\frac{1}{28} \mathcal{R}_3(\mathcal{R}_3 - 1) 2^4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$, qui est égal à l'ordre du groupe de l'équation aux vingt-sept droites : $27 \cdot 10 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 4$. Finalement, Jordan a montré qu'en adjoignant à l'équation aux tangentes doubles une de ses racines, les vingt-sept racines restantes dépendent d'une équation de degré 27 ayant le même groupe que l'équation aux vingt-sept droites.

Comme nous l'avons déjà écrit, Jordan conclut par ces mots :

« Ainsi se retrouve entre le problème des vingt-sept droites et celui de doubles tangentes, le lien remarquable signalé par M. Geiser (*Mathematische Annalen*, t. I^{er}) ».

77. En effet, si $\sigma \in H$, alors σ envoie un terme de φ_4 sur un terme de φ_4 puisque $\sigma \in G$. Comme de plus σ fixe la racine (110000), elle envoie un terme de φ_4 qui contient (110000) sur un terme de φ_4 qui contient (110000). Donc σ laisse φ'_4 invariante.

78. Prendre $(x''_1 y''_1 x''_2 y''_2 x''_3 y''_3) = (110000)$ dans les conditions données précédemment.

79. Le « groupe des vingt-sept droites » est le groupe H , ou plutôt le groupe $\tilde{H}$ obtenu en restreignant les substitutions de H à l'ensemble des racines exceptée (110000). Ce groupe est inclus dans le groupe de ψ par construction et le groupe de ψ est le même que celui de φ qui « est » le groupe des vingt-sept droites (toujours avec ce problème d'inclusion réciproque : voir la fin de 2.1).

80. Voir [34, p. 330]. Jordan montre par ailleurs que ces groupes de Steiner sont des groupes « abéliens ». Cela montre que le groupe des vingt-huit tangentes doubles est isomorphe au groupe symplectique $\mathrm{Sp}_6(\mathbf{F}_2)$.

81. Cela découle de la transitivité du groupe aux vingt-huit tangentes doubles. Petite coquille dans le *Traité*, où il est écrit « $\frac{1}{28}(\mathcal{R}_3 - 1) 2^4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$ ».

Notons que ce lien entre les quations aux vingt-sept droites et aux vingt-huit tangentes doubles trouve une application algbrique, puisqu'il permet Jordan de montrer que l'quation aux vingt-huit tangentes doubles n'a pas de rduite de degr strictement infrieur 28⁸².

Si on traduit cela avec les interprtations actuelles de ces groupes en groupes symplectiques (voir la fin de la section 2.2 et la note 80), on obtient donc une injection $\mathrm{Sp}_4(\mathbf{F}_3) \hookrightarrow \mathrm{Sp}_6(\mathbf{F}_2)$. Dieudonn indique quant lui que « les liens connus entre le problme des 28 tangentes et celui des 27 droites apparaissent [...] comme refltant l'isomorphisme exceptionnel entre $\mathrm{PU}_4^+(\mathbf{F}_4)$ et $\mathrm{PSp}_4(\mathbf{F}_3)$ »⁸³.

3.1.2. Les seize droites des surfaces quartiques conique double. Le problme des seize droites des surfaces quartiques conique double est trait dans le §III des « Applications gomtriques ». Avant de voir comment Jordan les relie aux vingt-sept droites des surfaces cubiques, regardons brivement ce qu'il fait de l'quation aux seize droites. Nous ne donnons ici que ce que nous jugeons utile pour comprendre le lien avec les vingt-sept droites.

Jordan rfre [9] pour l'expos des proprits qui suivent. Une surface quartique possdant une conique double contient seize droites. Il existe cinq cnes, auxquels chacune des seize droites est tangente. Pour chaque cne, les seize droites se rpartissent en huit couples de la faon suivante : il y a exactement quatre plans tangents au cne qui coupent la surface quartique en deux coniques dgnres en paires de droites, qui forment lesdits couples. Les droites peuvent se noter $1, 2, \dots, 16$, et ce qui vient d'tre dit se rsume sur le tableau suivant :

I	2, 6;	3, 7;	4, 8;	5, 9;	1, 16;	10, 15;	11, 14;	12, 13
II	1, 6;	3, 10;	4, 11;	5, 12;	2, 16;	7, 15;	8, 14;	9, 13
III	1, 7;	2, 10;	4, 13;	5, 14;	3, 16;	6, 15;	8, 12;	9, 11
IV	1, 8;	2, 11;	3, 13;	5, 15;	4, 16;	6, 14;	7, 12;	9, 10
V	1, 9;	2, 12;	3, 14;	4, 15;	5, 16;	6, 13;	7, 11;	8, 10

o sur une ligne sont crites (par couples correspondant chacun une conique dgnre) les droites correspondantes un des cinq cnes, et, toujours sur une ligne donne, les droites d'un mme plan tangent sont crites quatre cases d'intervalle. Par exemple, pour le cne I, les droites 2, 6, 1 et 16 sont dans un mme plan tangent.

Suivant son mode opratoire, Jordan introduit une fonction φ qui est la somme de tous les produits de racines correspondant au tableau prcdent (nous ajoutons l'indice 16 φ pour la distinguer de la fonction correspondante dans le cas des vingt-sept droites)⁸⁴ :

$$\varphi_{16} = 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 + 5 \cdot 9 + \dots + 5 \cdot 16 + 6 \cdot 13 + 7 \cdot 11 + 8 \cdot 10,$$

et Jordan montre que le groupe de l'quation X aux seize droites est inclus dans le groupe G_{16} des substitutions de $\{1, 2, \dots, 16\}$ qui laissent φ_{16} invariante. Comme dans les autres cas, il ne fait aucune remarque sur l'inclusion rciproque.

Jordan introduit dix « fonctions partielles $a_1, b_1, \dots, a_5, b_5$ », formes des quatre termes des lignes des deux blocs du tableau prcdent. Par exemple,

$$a_1 = 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 + 5 \cdot 9 \quad \text{et} \quad b_1 = 1 \cdot 16 + 10 \cdot 15 + 11 \cdot 14 + 12 \cdot 13.$$

82. L'existence de rduite de degr infrieur 27 est exclue puisque l'quation aux vingt-sept droites n'en n'a pas. Et si une rduite E_{27} de degr 27 existait, Jordan montre avec des arguments analogues ceux rencontrs en section 2.4 (points 1 5) que l'adjonction d'une racine donnerait une quation E_{26} dont les facteurs irrductibles auraient des degrs d'une part au moins gaux 7, et d'autre part compris entre 8 et 14, ce qui est impossible.

83. [36, p. xxiii].

84. Dans l'expression de φ_{16} , « 2 » par exemple est lire comme tant le symbole de la racine de l'quation aux seize droites correspondant la droite numrote 2.

Il note Y l'équation de degré 10 dont dépendent ces quantités. Jordan introduit également les substitutions

$$\begin{aligned} A &= (2, 1)(10, 7)(11, 8)(12, 9) & A_1 &= (6, 7)(14, 12)(13, 11)(3, 2) \\ A_2 &= (7, 8)(10, 11)(4, 3)(14, 15) & A_3 &= (8, 9)(11, 12)(13, 14)(5, 4) \\ B &= (9, 16)(4, 10)(2, 13)(3, 11)(5, 1)(6, 12)(7, 14)(8, 15) \\ B_1 &= (12, 16)(4, 7)(1, 13)(3, 8)(5, 2)(6, 9)(19, 14)(11, 15) \\ B_2 &= (14, 16)(4, 6)(1, 11)(2, 8)(5, 3)(7, 9)(10, 12)(13, 15) \\ B_3 &= (15, 16)(3, 6)(1, 10)(2, 7)(5, 4)(8, 9)(11, 12)(13, 14) \end{aligned}$$

ainsi que

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= (a_1 a_2)(b_1 b_2), & \mathcal{A}_1 &= (a_2 a_3)(b_2 b_3), \\ \mathcal{A}_2 &= (a_3 a_4)(b_3 b_4), & \mathcal{A}_3 &= (a_4 a_5)(b_4 b_5) \\ \mathcal{B} &= (a_1 b_1)(a_5 b_5), & \mathcal{B}_1 &= (a_2 b_2)(a_5 b_5), \\ \mathcal{B}_2 &= (a_3 b_3)(a_5 b_5), & \mathcal{B}_3 &= (a_4 b_4)(a_5 b_5) \end{aligned}$$

dont il montre qu'elles engendrent respectivement le groupe de X et le groupe de Y . Enfin, il montre que ces deux groupes sont de même ordre⁸⁵ $16 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$.

Passons maintenant au lien entre les seize droites et les vingt-sept droites. Nous avons laissé en suspend l'analyse du dernier paragraphe de la section sur les surfaces cubiques. Le voici :

« Supposons que l'on s'adjoigne une des racines de l'équation aux vingt-sept droites, telle que a . Il restera une équation de degré 26, dont le groupe est dérivé des substitutions B, C, D, E, F . Ce groupe n'étant pas transitif, l'équation se décompose en deux facteurs rationnels, du seizième et du dixième degré. On voit sans peine que ces équations partielles ont les mêmes groupes que les équations X et Y du §III ». [34, p. 329]

Jordan ne donne pas de démonstration de ces affirmations. Voyons comment combler les trous. Nous adoptons un vocabulaire moderne tout en essayant de rester dans l'esprit des preuves de Jordan.

Notons E_{26} l'équation obtenue par adjonction de la racine a . Son groupe G_{26} est formé des substitutions de G , groupe de l'équation aux vingt-sept droites, qui fixent a . Il contient donc le groupe $\langle B, C, D, E, F \rangle$ engendré par B, C, D, E et F , puisque ces dernières fixent toutes a . Or $\#G_{26} = \#G/27$ car G agit transitivement, et vu ce qui a été fait en 2.2, $\#\langle B, C, D, E, F \rangle \geq 10 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 2 = \#G/27$, ce qui montre l'égalité $G_{26} = \langle B, C, D, E, F \rangle$ annoncée par Jordan.

Pour voir que G_{26} n'est pas transitif, on peut par exemple chercher quelles sont les orbites de son action sur les vingt-six racines $b, c, \dots, u'$. Grâce aux expressions de B, C, D, E et F , on obtient aisément deux orbites, formées respectivement de 10 et de 16 éléments :

$$\omega_{10} = \{b, c, d, e, f, g, h, i, k, l\}$$

et

$$\omega_{16} = \{m, n, p, q, r, s, t, u, m', n', p', q', r', s', t', u'\},$$

qui correspondent d'ailleurs respectivement aux droites incidentes à a et à celles qui ne lui sont pas incidentes. Cela montre que G_{26} n'est pas transitif. Et si on pose

$$E_{10} = \prod_{\xi \in \omega_{10}} (x - \xi) \text{ et } E_{16} = \prod_{\xi \in \omega_{16}} (x - \xi), \text{ alors on a}$$

$$E_{26} = E_{10}E_{16},$$

et chacun des facteurs E_{10} et E_{16} , étant invariant sous l'action de G_{26} , est bien rationnel. Il reste à voir pourquoi ces facteurs ont mêmes groupes que les équations X et Y issues des seize droites.

⁸⁵. Ils sont même isomorphes, puisqu'en plus, les fonctions $a_1, \dots, b_5$ sont rationnelles en les racines $1, \dots, 16$.

Nous nous inspirons de ce que Jordan fait pour les vingt-huit tangentes doubles (voir la section 3.1.1). Introduisons

$$\varphi' = mn + pq + rs + tu + \dots + nt' + um' + rq' + ps',$$

dont les quatre premiers termes correspondent aux paires de droites de ω_{16} incidentes b , les quatre suivants aux paires de droites de ω_{16} incidentes c , etc. — utiliser par exemple la liste des quarante-cinq triangles donne en 2.1 afin de trouver tous les termes de φ' . Le groupe de φ' contient alors le groupe de E_{16} . En effet, tout lment σ du groupe de E_{16} provient d'une substitution $\tilde{\sigma}$ appartenant au groupe de E_{26} ; autrement dit, $\tilde{\sigma}$ coincide avec σ sur $\{m, n, \dots, u'\}$ et induit une certaine permutation de $\{b, c, \dots, l\}$. Regardons par exemple l'image de mn par σ . Comme $\tilde{\sigma}$ est dans le groupe de E_{26} , les trois droites $\tilde{\sigma}(b)$, $\sigma(m)$ et $\sigma(n)$ forment un triangle. Comme $\tilde{\sigma}(b) \in \{b, c, \dots, l\}$, le produit $\sigma(m)\sigma(n)$ apparat dans φ' , par construction mme de celle-ci. D'o l'inclusion annonce.

On remarque alors que les fonctions φ' et φ_{16} sont identiques la notation prs, la correspondance de la notation des racines tant donne par le tableau suivant :

2, 6; m, n	3, 7; q, p	4, 8; s, r	5, 9; u, t	1, 16; n', m'	10, 15; q', p'	11, 14; s', r'	12, 13 u', t'
1, 6; n', n	3, 10; q, q'	4, 11; s, s'	5, 12; u, u'	2, 16; m, m'	7, 15; p, p'	8, 14; r, r'	9, 13 t, t'
1, 7; n', p	2, 10; m, q'	4, 13; s, t'	5, 14; u, r'	3, 16; q, m'	6, 15; n, p'	8, 12; r, u'	9, 11 t, s'
1, 8; n', r	2, 11; m, s'	3, 13; q, t'	5, 15; u, p'	4, 16; s, m'	6, 14; n, r'	7, 12; p, n'	9, 10 t, q'
1, 9; n', t	2, 12; m, u'	3, 14; q, r'	4, 15; s, p'	5, 16; u, m'	6, 13; n, t'	7, 11; p, s'	8, 10 r, q'

Par consquent, φ_{16} et φ' ont mme groupe et donc le groupe de E_{16} est inclus dans le groupe de φ_{16} . De mme, en introduisant

$$\varphi'' = bc + de + fg + hi + kl,$$

on montre que le groupe de E_{10} est inclus dans le groupe de $\varphi_{10} = a_1b_1 + \dots + a_5b_5$, la correspondance des notations tant cette fois donne par

a_1	b_1	a_2	b_2	a_3	b_3	a_4	b_4	a_5	b_5
b	c	d	e	f	g	h	i	k	l .

Pour montrer l'galit de ces groupes, on va montrer que toutes les substitutions des groupes de φ_{10} et de φ_{16} se « retrouvent » dans les groupes de E_{10} et E_{16} respectivement.

Pour le groupe de E_{10} par exemple : le groupe de φ_{10} est engendr par les substitutions $\mathcal{A}, \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{B}_3$ dcrites prcdemment. Prenons $\mathcal{A} = (a_1 a_2)(b_1 b_2)$, et dfinissons en consquence $\tilde{\mathcal{A}} = (b d)(c e)$. On vrifie facilement que cette substitution $\tilde{\mathcal{A}}$ (sur $\{b, c, \dots, l\}$) provient de la substitution $BC^2B \in G_{26}$. De mme, on peut vrifier que la substitution $\tilde{\mathcal{B}} = (b c)(k l)$, correspondant $\mathcal{B}$, provient de $BE^2DB^2DE^2$. Avec des vrifications similaires, on voit que le groupe $\langle \tilde{\mathcal{A}}, \dots, \tilde{\mathcal{B}}_3 \rangle$ est contenu dans le groupe de E_{10} . Mais $\langle \tilde{\mathcal{A}}, \dots, \tilde{\mathcal{B}}_3 \rangle$ est clairement isomorphe $\langle \mathcal{A}, \dots, \mathcal{B}_3 \rangle$ qui est le groupe de φ_{10} .

Finalement, le groupe de E_{10} est égal au groupe de φ_{10} , qui est égal⁸⁶ au groupe de l'équation Y . On montre de même que le groupe de E_{16} est égal au groupe de l'équation aux seize droites X .

En résumé, par l'adjonction d'une de ses racines, les vingt-six racines restantes de l'équation aux vingt-sept droites dépendent d'une équation de degré 26 qui se factorise en deux équations de degrés respectifs 16 et 10. Ces deux équations possèdent le même groupe que l'équation aux seize droites. Voilà ce qu'il en est des « recherches algébriques » de Jordan. Comparons à présent avec l'approche de Geiser.

3.2. Les « considérations géométriques » de Geiser. Mathématicien suisse, petit-neveu de Jacob Steiner, Carl Friedrich Geiser (1843-1934) a été formé à l'Université de Berlin, où il fut grandement influencé par son grand-oncle, par Karl Weierstraß et par Leopold Kronecker. S'occupant dans ses recherches essentiellement de géométrie algébrique, il a été surtout un professeur et un administrateur zélé de l'E.T.H., au développement duquel il a largement participé. Pour plus de détails sur la vie et l'œuvre de Geiser, consulter [42, 14].

Pour Arnold Emch, auteur d'une nécrologie de Geiser, le lien entre surfaces cubiques et courbes quartiques fait partie des travaux les plus importants de ce dernier. L'article qui traite de ce lien a été publié en 1869 dans le premier numéro des *Mathematische Annalen*, alors que celui sur les surfaces quartiques à conique double est paru la même année dans le *Journal für die reine und angewandte Mathematik*.

Les deux articles sont classés dans la rubrique « Nouvelle géométrie synthétique » du *Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik*⁸⁷. Peut-être parce que cette géométrie de la seconde moitié du XIX^e siècle a en grande partie disparu — en tant que telle du moins — du paysage mathématique actuel, les raisonnements de Geiser sont assez difficiles à suivre, en particulier si l'on essaie de traduire chacun de ses points en termes d'équations. D'ailleurs, dans la préface de son manuel *Einleitung in der synthetische Geometrie*⁸⁸, Geiser parle de vouloir développer la « capacité d'intuition spatiale⁸⁹ » des étudiants, ce qui indique sans doute la vision intuitive des choses avec laquelle Geiser travaillait. Afin de rendre la lecture des ses preuves plus aisée, nous conseillons ainsi au lecteur de ne pas penser en termes d'équations et de garder à l'esprit les quelques faits suivants, très fréquemment utilisés — souvent implicitement — par Geiser⁹⁰ :

- (1) L'intersection d'une surface algébrique de degré n avec un plan est une courbe (algébrique plane) de degré n .
- (2) Deux courbes algébriques planes de degrés m et n se coupent en mn points : c'est le théorème de Bezout.
- (3) Étant donnés les n^2 points d'intersection de courbes planes de degré n , il existe une infinité de courbes de degré n passant par ces points d'intersection. La famille formée de toutes ces courbes est appelée un *faisceau de courbes*, et les points d'intersection communs sont appelés les *points-base* du faisceau.

86. Toujours en supposant que le groupe de φ_{10} est exactement le groupe de Y . Voir la fin de la section 2.1.

87. Le second apparaît également dans la section « Géométrie analytique », à la rubrique « Correspondance, transformation univoque, représentation ». Nous y reviendrons.

88. [20].

89. « Es galt zunächst, unter möglichst geringen Voraussetzungen das räumliche Anschauungsvermögen der Zuhörer auszubilden. » [20, p. III]. Lisant cette phrase, il est difficile de ne pas penser aux discours de Klein sur l'intuition géométrique. Sur ce point, en particulier face au mouvement d'arithmétisation, voir [52].

90. Voir par exemple [57] et [58] pour un point de vue de géométrie analytique ; ou [55] pour un point de vue de géométrie synthétique. Plus spécifiquement, Clebsch donne dans [47, p. 195] un petit aperçu historique pour la notion de faisceau (de courbes, de surfaces). Il attribue notamment la paternité de la notion à Gabriel Lamé et renvoie à [53] et [54].

- (4) Une quation d'une courbe de degr n contient $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ coefficients, donc $\frac{(n+1)(n+2)}{2} - 1 = \frac{n(n+3)}{2}$ coefficients indpendants. Ainsi, par $\frac{n(n+3)}{2}$ points en position gnrale dans le plan passe une et une seule courbe algbrique de degr n . Par exemple, 9 (resp. 14) points en position gnrale dfinissent une unique courbe cubique (resp. quartique)⁹¹.
- (5) On peut dfinir un faisceau de courbes de degr n comme tant l'ensemble (infini) des courbes de degr n passant par $r = \frac{n(n+3)}{2} - 1$ points donns *a priori*, pourvu que ces r points soient en position convenable. Les r points sont les points-base du faisceau. Par exemple, on peut dfinir un faisceau de courbes quartiques partir de 13 points-base (et alors toutes les quartiques du faisceau passent ncessairement par 3 autres points).
- (6) De faon analogue, une quation de surface cubique contient 20 coefficients, donc 19 coefficients indpendants. Par consquent, par 19 points de l'espace en position gnrale passe une unique surface cubique ; par 18 points passent une infinit de surfaces cubiques : c'est un *faisceau de surfaces cubiques*, et les 18 points sont les *points-base* du faisceau.

De plus, Geiser considre des multiplicits de comptage d'objets, par exemple des multiplicits d'intersection. Si la notion de multiplicit semble matrise dans les noncs de proprits, Geiser introduit presque systmatiquement des « points infiniment voisins » quand il s'agit de faire des dmonstrations⁹². Nous choisissons dans la suite d'omettre le recours ces points infiniment voisins, dans le but d'allger un peu les preuves de Geiser.

Enfin, nous donnerons ponctuellement des explications supplmentaires en renvoyant le lecteur nos propres figures. Soulignons que les articles de Geiser ne contiennent aucune figure ; ils ne sont constitus que de texte. Voir la figure 3.1, reprsentative des articles de Geiser.

Les notations que nous utilisons sont celles de Geiser. Ainsi, les lettres utilises sont en gnral les initiales du nom (allemand) des objets qu'elles dsignent, et les indices, quand il y en a, correspondent au degr de l'objet en question. Par exemple, C_n dsigne une courbe de degr n et F_n une surface de degr n .

3.2.1. Des tangentes doubles aux vingt-sept droites. L'article sur les tangentes doubles est divis en huit sections numrotes en chiffres romains. Les trois premires sections tablissent le lien entre les vingt-huit tangentes doubles des courbes quartiques et les vingt-sept droites des surfaces cubiques. Dans les cinq dernires sections, Geiser drive partir de ce lien des proprits des vingt-huit tangentes doubles partir de proprits des vingt-sept droites. Comme ces applications ne sont pas ici notre propos, nous n'en dirons pas beaucoup leur sujet ; nous regarderons tout de mme la section V, qui nous permettra de faire le lien entre l'approche de Geiser et celle de Jordan. Voyons prsent les trois premires sections.

Dans la section I, Geiser montre comment, partir d'une surface cubique, construire une courbe quartique plane, et d'o, dans cette construction, proviennent les tangentes doubles cette dernire partir des vingt-sept droites de la surface cubique.

91. Cela peut sembler contradictoire avec le point prcdent : c'est le paradoxe de Cramer. Il s'explique par le fait que (par exemple pour les cubiques) les 9 points d'intersection de courbes cubiques ne sont pas en position gnrale, justement parce qu'ils sont dfinis par une intersection particulire.

92. Salmon utilise aussi cette notion, mais parle plutt de « points conscutifs ». Voir par exemple [57, p 35] ou encore [56, p. 258], o la notion est utilise dans une des preuve de l'existence des vingt-sept droites.

Ueber die Doppeltangenten einer ebenen Curve vierten Grades.

Von Dr. GEISER in ZÜRICH.

I.

Die Eigenschaften der 28 Doppeltangenten einer allgemeinen Curve vierten Grades lassen sich sehr anschaulich mit den gegenseitigen Beziehungen der 27 Geraden einer Fläche dritten Grades in Zusammenhang bringen.

Sei F_3 eine Fläche dritten Grades ohne Singularitäten, p ein willkürlich im Raum angenommener Punkt, so ist der von p aus der F_3 umschriebene Tangentenkegel vom sechsten Grade. Liegt p auf F_3 selbst, so besteht der Tangentenkegel aus der doppelt gelegten Tangentialebene E der F_3 in p und aus einem Kegel vierten Grades K_4 . Sei g eine der 27 Geraden der F_3 , so schneidet die durch p und g gelegte Ebene e , welche eine Doppeltangentialebene von K_4 ist, aus F_3 neben g noch einen Kegelschnitt aus, der mit g zwei Punkte (r, s) gemein hat. Werden diese Punkte durch gerade Linien mit p verbunden, so erhält man die beiden Berührungskanten von K_4 mit e . Ausser den 27 Ebenen e ist auch noch E eine Doppeltangentialebene von K_4 ; ihre beiden Berührungskanten sind die Haupttangenten t_1 und t_2 der F_3 in p .

Die erste Polare F_2 des Punktes p ist eine Fläche zweiten Grades, welche durch die 54 Punkte (r, s) geht, und auf welcher die Haupttangenten t_1 und t_2 ihrer ganzen Ausdehnung nach liegen. Dieselbe schneidet F_3 in einer Raumcurve sechsten Grades C_6 , welche in p einen Doppelpunkt besitzt; verbindet man diesen mit allen Punkten der C_6 durch Geraden, so erhält man den Tangentenkegel K_4 , oder auch: die sämtlichen Tangenten der C_6 bestimmen mit dem Punkte p die sämtlichen Tangentialebenen von K_4 .

Es mag noch bemerkt werden, dass keine der Tangenten C_6 , deren Berührungspunkt nicht p ist, diesen Punkt enthalten wird, denn sonst wäre diese Tangente eine Gerade der F_3 , während, um die Allgemeinheit der Resultate zu wahren, für die vorliegende Betrachtung aus-

Mathematische Annalen I. *

9

FIGURE 3.1. Première page de l'article « Ueber die Doppeltangenten einer ebenen Curve vierten Grades » de Geiser.

Geiser considère donc une surface cubique sans singularité F_3 , et un point p de l'espace. Il énonce que le cône de sommet p tangent à la surface⁹³ est de degré 6, et que dans le cas où p appartient à la surface cubique, ce qui est supposé dans la suite, ce cône se compose du plan E tangent à la surface en p et d'un cône K_4 de

93. Par définition, le cône de sommet p tangent à la surface cubique est l'ensemble des points p' de l'espace tels que la droite pp' soit tangente à la surface. Cayley et Salmon l'avaient déjà utilisé en 1849 dans [5] pour établir l'existence des vingt-sept droites sur les surfaces cubiques. Pour une preuve analytique, c'est-à-dire avec des méthodes de géométrie analytique, des résultats utilisés ici par Geiser, on peut par exemple regarder [58]. Se reporter également à la fin de cette section 3.2.1, où le calcul mené permet de voir dans un cas particulier que le degré d'un cône tangent à une surface de degré n est $n(n-1)$.

degr 4. Geiser prend alors une droite g de la surface cubique : le plan e contenant p et g coupe la surface cubique en une courbe de degr 3 contenant ncessairement la droite g , donc compose de la droite g et d'une conique. Les points d'intersection de cette conique avec g sont nots r et s ; le plan e est tangent la surface cubique en chacun de ces points, puisque ce sont des points doubles de la courbe intersection de e et de F_3 . Le plan e est par consquent un plan tangent double au cne K_4 , les artes de contact tant les droites pr et ps . Geiser obtient ainsi 27 plans tangents doubles e K_4 , auxquels il ajoute le plan E qui est galement doublement tangent K_4 , les artes de contact tant dans ce cas les deux tangentes principales⁹⁴ t_1, t_2 la surface cubique en p .

La construction de la courbe quartique est alors la suivante (se reporter en parallle la figure 3.2). Geiser considre un plan $\mathfrak{E}$ de l'espace. Ce plan coupe le cne K_4 selon une courbe quartique (plane) C_4 dont les vingt-huit tangentes doubles sont obtenues comme suit. Pour chaque plan e comme prcdemment, l'intersection de e avec $\mathfrak{E}$ est une droite g' qui est tangente double la quartique, les points de contact tant les points d'intersection r' et s' de $\mathfrak{E}$ avec pr et ps . Cela donne vingt-sept tangentes doubles. La dernire est l'intersection γ' des plans $\mathfrak{E}$ et E , les points de contact t'_1, t'_2 tant les points d'intersection de $\mathfrak{E}$ avec les tangentes principales t_1, t_2 .

Rcapitulons : on obtient une courbe quartique C_4 en intersectant le cne K_4 avec un plan quelconque $\mathfrak{E}$. Parmi les vingt-huit tangentes doubles C_4 , vingt-sept sont les projections (de centre p) sur $\mathfrak{E}$ des droites de F_3 et la vingt-huitime est l'intersection de $\mathfrak{E}$ et du plan tangent F_3 en p .

FIGURE 3.2. Construction de la quartique C_4 . Les deux quartiques sont des sections du cne K_4 . La droite g de la surface cubique se projette sur une tangente double g' de la quartique C_4 .

Avant de passer la construction rciproque, Geiser tablit une proprit de la configuration gomtrique qu'il vient de construire. Bien qu'il ne le dise pas, cette proprit lui permet de prparer la construction rciproque. Geiser prouve ainsi que le plan $\mathfrak{E}$ rencontre la surface cubique en une courbe cubique C_3 qui est tangente la courbe quartique C_4 en six points. Il montre en outre que ces six points ainsi que t'_1 et t'_2 sont situs sur une mme conique C_2 .

L'objectif de Geiser dans la section II est de montrer

94. Les tangentes principales (« Haupttangenten ») une surface en un point sont les deux droites tangentes cette surface en p avec un contact d'ordre au moins 3. Voir [58, p. 244], o l'auteur les dsigne sous le nom « inflexional tangents ».

« que réciproquement, toute courbe plane C_4 de degré 4 peut être mise en relation avec une surface du troisième degré de la façon qui vient d'être expliquée⁹⁵. » [21, p. 130]

Geiser commence par montrer le théorème suivant. Étant donnée une courbe quartique plane C_4 , on fait passer une conique quelconque C_2 par les deux points de contact t'_1, t'_2 de cette courbe avec une de ses tangentes doubles, notée γ' . Cette conique coupe la quartique en six autres points $b_1, \dots, b_6$. Alors il existe une courbe cubique C_3 qui est tangente à la quartique en ces six points⁹⁶ (voir la figure 3.3).

FIGURE 3.3. Construction de la conique C_2 et de la cubique C_3 . Pour des raisons de place, seule une des composantes connexes de C_3 apparaît sur cette figure. Les points b_5 et b_6 sont des points complexes et n'apparaissent donc pas sur cette figure.

Voici la démonstration de Geiser du théorème précédent. On définit un faisceau de quartiques avec la courbe C_4 et la courbe C_2 , comptée avec multiplicité 2 : les points-base de ce faisceau sont $t'_1, t'_2, b_1, \dots, b_6$, chacun étant compté avec multiplicité 2. On définit ensuite une courbe cubique C_3 assujettie à passer par b_1, b_2, b_3 (comptés avec multiplicité 2) et par b_4, b_5, b_6 (comptés avec multiplicité 1), puis on définit la courbe C_4'' comme étant la réunion de C_3 et de γ' . Par construction, C_4'' passe par $t'_1, t'_2, b_1, b_2, b_3$ avec multiplicité 2 et par b_4, b_5, b_6 avec multiplicité 1. Or, ce sont là les 13 points-base du faisceau ; par conséquent, C_4'' fait partie du faisceau, et en particulier, elle contient b_4, b_5, b_6 avec multiplicité 2. Comme enfin ces trois points ne sont pas sur γ' , ils sont sur C_3 . Donc C_3 contient $b_1, \dots, b_6$ avec multiplicité 2 à chaque fois : c'est dire que C_3 est tangente à C_4 en ces six points.

Geiser passe ensuite à la construction de la surface cubique. Il part d'une courbe quartique C_4 contenue dans un plan $\mathfrak{E}$ et lui applique le théorème que nous venons d'énoncer, obtenant ainsi une cubique C_3 . Il considère un point p situé hors de $\mathfrak{E}$ ainsi que le plan E contenant p et la tangente double γ' . Dans ce plan E , il construit une courbe cubique C_3' ayant p comme point double, avec pt'_1, pt'_2 comme

95. « Dass umgekehrt jede beliebige ebene Curve vierten Grades C_4 zu eine Fläche dritten Grades in die eben auseinandergesetzte Beziehung gebracht werden kann. »

96. Ce théorème est une sorte de réciproque à la propriété de la fin de la section I. En outre, Geiser fait référence à [30], où le même théorème est donné et démontré.

tangentes en ce point, et passant par les trois points d'intersection de γ' et de C_3 ⁹⁷. Se reporter la figure 3.4 pour visualiser la situation ce stade de la preuve.

FIGURE 3.4. La cubique C'_3 , en gras, est dans le plan E dfini par p et par γ' . Le troisime point d'intersection de γ' et de C_3 n'apparat pas sur la figure.

Geiser dfinit alors un faisceau de surfaces cubiques contenant C_3 , C'_3 , b_1 , b_2 et b_3 ⁹⁸. Il justifie cette existence par le fait que ces lments comptent pour 18 points . En effet, la cubique C_3 compte pour 9 points et la cubique C'_3 compte pour 6 points car elle est assujettie passer par les trois points de $\gamma' \cap C_3$. Il y a donc 18 points, ce qui permet de dfinir un faisceau.

Ce faisceau de surfaces cubiques donne lieu un faisceau de cnes de degr 4 16 artes-base (les artes pt'_1 , pt'_2 , pb_1 , $\dots$, pb_6 toutes comptes deux fois), chacun de ces cnes tant le cne de sommet p tangent une surface cubique du premier faisceau. Les intersections de ces cnes avec le plan $\mathfrak{E}$ forment leur tour un faisceau de courbes quartiques seize points-base $t'_1, t'_2, b_1, \dots, b_6$ (tous compts deux fois). Puisque la quartique C_4 du dpart contient tous ces points-base, elle fait partie du faisceau. Geiser en dduit qu'il lui correspond une surface cubique du premier faisceau. Cette surface est celle qui tait cherche, et Geiser conclut :

97. L'existence de C'_3 n'est pas justifie. Geiser laisse implicite le fait qu'imposer les tangentes pt'_1 , pt'_2 en p compte pour 2×2 conditions ponctuelles. Il y a donc bien en tout 9 conditions ponctuelles.

Tout est fait pour reconstruire la surface cubique au vu de ce qui a t fait dans la section I : l'intersection de celle-ci avec $\mathfrak{E}$ doit tre C_3 , l'intersection avec E doit tre une courbe cubique avec un point double en p (puisque E est tangent la surface en p), etc.

98. La cubique cherche fait ncessairement partie de ce faisceau, puisque d'aprs ce qui a t vu par Geiser en section I, elle doit contenir C_3 , C'_3 , b_1 , b_2 et b_3 .

« Une courbe plane quelconque de degré quatre peut toujours être conçue comme l'intersection du plan la contenant avec le cône tangent à une surface du troisième degré en un point de cette surface⁹⁹. » [21, p. 132]

Cela constitue ainsi la construction réciproque de celle de la section I, et établit donc le lien entre surface cubiques et courbes quartiques.

Dans la troisième section, Geiser propose de montrer de façon analytique¹⁰⁰ le dernier théorème que nous avons cité (note 99). Il choisit dans le plan U de la quartique C_4 des coordonnées (projectives) x, y, z telles que l'axe des z soit une des tangentes doubles à la quartique et les autres axes passent par les points de contact de cette tangente double avec la quartique. Il énonce alors que l'équation de la courbe est de la forme¹⁰¹

$$z \cdot \varphi_3(x, y, z) - x^2 y^2 = 0,$$

où φ_3 est une fonction homogène de degré 3. Geiser considère un point p situé hors du plan U et forme les plans X, Y, Z contenant p et les axes des x, y, z respectivement. Les coordonnées de l'espace choisies sont x, y, z, u , et Geiser affirme que la surface d'équation

$$F_3 = \varphi_3(x, y, z) + 4uxy + 4u^2z = 0$$

est telle que l'intersection de son cône tangent en p par le plan U est exactement la courbe quartique du départ.

Complétons Geiser en vérifiant ce dernier point. Pour cela, suivons la démarche que Salmon utilise dans [58, p. 245] pour trouver le degré d'un cône tangent à une surface. Soit $q \neq p$ un point de coordonnées x, y, z, u . Il appartient au cône tangent si, et seulement si la droite pq est tangente à F_3 . Comme les points de la droite pq sont les points de coordonnées $(\mu x, \mu y, \mu z, \lambda + \mu u)$ avec $(\lambda : \mu)$ quelconque, cette droite est tangente à F_3 si, et seulement si l'équation

$$F_3(\mu x, \mu y, \mu z, \lambda + \mu u) = 0$$

possède une racine double en $(\lambda : \mu)$. Or cette équation s'écrit

$$(\varphi_3(x, y, z) + 4xyu + 4zu^2)\mu^3 + 4(xy + zu)\mu^2\lambda + 4z\mu\lambda^2 = 0.$$

Elle possède une solution double si, et seulement si son discriminant est nul, c'est-à-dire si, et seulement si

$$(xy + uz)^2 - z(\varphi_3(x, y, z) + 4xyu + zu^2) = 0.$$

Cette dernière équation est celle du cône ; son intersection avec le plan U s'obtient en y substituant $u = 0$, ce qui conduit à

$$x^2 y^2 - z\varphi_3(x, y, z) = 0,$$

ce qui est bien l'équation de la quartique C_4 .

99. « Eine beliebige Curve vierten Grades in der Ebene kann stets aufgefasst werden als der Durchschnitt des Tangentenkegels, welcher von einem Punkte einer Fläche dritten Grades aus an diese Fläche geht, mit der Ebene der Curve. »

100. « Auch analytisch ergibt sich dieser Satz leicht », [21, p. 132]. Geiser ne donne pas de raison à son choix de présenter une démonstration analytique.

101. En effet, il suffit de traduire les conditions sur les points de contact de la tangente double : par exemple, dire que le point de coordonnées $(1 : 0 : 0)$ appartient à la courbe signifie que l'équation de celle-ci ne contient pas de terme en x^4 ; dire que ce même point est point de contact d'une tangente implique qu'il n'y a pas de terme en y^3x , etc.

Comme nous l'avons annonc, voyons encore ce que fait Geiser dans la section V. Il considre une surface cubique F_3 , un point p de cette surface et trois droites g_1, g_2, g_3 de la surface formant un triangle. Il rappelle que les plans contenant p et g_i coupent la surface F_3 en la droite g_i et une conique K_i , et note comme il l'a fait prcdemment r_i, s_i les points d'intersection de g_i et K_i . Puisque tous les points r_i, s_i appartiennent la fois la polaire F_2 de p par rapport F_3 et au plan du triangle $g_1g_2g_3$, ils sont tous situs sur une mme conique K . En outre, comme les tangentes principales t_1, t_2 sont contenues dans F_2 , elles intersectent ncessairement la conique K .

Geiser applique ensuite son rsultat de la section I : les trois droites g_1, g_2, g_3 se projettent en trois tangentes doubles g'_1, g'_2, g'_3 la quartique C_4 dont les points de contact sont les projections r', s' des points r, s . De plus, les droites t_1, t_2 deviennent les points de contact t'_1, t'_2 d'une autre tangente double γ' . Enfin, la conique K se projette sur une conique K' du plan de la courbe C_4 , de sorte que les 8 points de contact r', s', t'_1, s'_1 appartiennent cette conique K' .

Rsumons : les vingt-huit tangentes doubles d'une courbe quartique se regroupent 4 par 4 de sorte que les 8 points de contact correspondants sont situs sur une mme conique. Plus prcisment, si on se donne une tangente double γ' , elle se regroupe avec chaque triplet de tangentes doubles correspondant un triplet de droites de la surface cubique formant un triangle. Cela concorde avec ce que Jordan a fait pour l'quation aux vingt-huit tangentes doubles. En effet, Jordan a utilis ces groupements de 4 tangentes doubles pour introduire une fonction φ_4 (voir le dbut de la section 3.1.1). Il a ensuite montr que l'adjonction d'une des racines mne une nouvelle fonction ψ dont les termes correspondent aux tangentes qui taient groupes avec celle donne par la racine adjointe. Enfin, Jordan a fait remarquer que cette fonction ψ est identique la fonction φ des vingt-sept droites, laquelle est forme grce aux 45 triangles.

Il existe donc bien un parallle entre l'approche de Jordan et celle de Geiser : il s'agit d'interprter l'adjonction d'une racine en la distinction d'une tangente double et de voir que les droites (ou les racines) en relation avec celle-ci correspondent trois par trois aux triangles d'une surface cubique. Cependant, notons bien que ni Geiser ni Jordan ne proposent une telle interprtation. Nous y reviendrons plus tard, aprs avoir regard ce que Geiser fait pour le lien entre les vingt-sept droites et les seize droites.

3.2.2. Des vingt-sept droites aux seize droites. L'article de Geiser sur les surfaces quartiques conique double est divis en cinq sections numrotes en chiffres romains. Il dbute par une courte introduction, essentiellement constitue de ce que nous avons cit au dbut de la section 3, o est entre autres annonce la dmonstration gomtrique de la relation entre les seize droites de ces quartiques et les vingt-sept droites des surfaces cubiques. Cette introduction annonce galement que la dmonstration sera effectue de deux manres diffrentes. De fait, les sections I et II constituent une premire manre ; les sections III et IV en constituent une seconde. Dans la dernire section, Geiser expose quelques proprits supplmentaires dans le cas o la conique double de la quartique est le « cercle imaginaire l'infini ». Nous ne parlons pas de ces proprits qui sortent de notre propos.

Premire dmonstration : reprsentations de surfaces sur un plan. La premire dmonstration utilise la thorie des reprsentations de surfaces sur un plan, et plus particulirement les reprsentations des surfaces cubiques et des surfaces quartiques conique double. Avant de dcrire la dmarche de Geiser, expliquons en quoi consiste cette thorie, en prenant pour exemple la reprsentation des surfaces cubiques sur un plan.

Dans un article intitulé « Die Geometrie auf den Flächen dritter Ordnung »¹⁰², Clebsch montre le résultat suivant :

« À chaque point du plan correspond en général un point de la surface et réciproquement ; sont exceptés seulement six points du plan, auxquels ne correspondent pas des points de la surface, mais des droites¹⁰³ ». [8, p. 361]

La correspondance dont parle Clebsch est justement la représentation de la surface sur un plan. Plus précisément, nous allons voir que, en termes modernes, Clebsch établit une transformation birationnelle entre le plan (projectif) et la surface cubique. En fait, la représentation qu'il donne s'interprète avec un point de vue actuel comme l'éclatement du plan projectif en six points¹⁰⁴. Voyons donc comment Clebsch construit cette représentation. Nous suivons sa démarche tout en utilisant un formalisme et des notations plus actuels afin d'alléger cette explication.

Rappelons d'abord qu'une *gerbe de plans* est l'ensemble des plans de l'espace passant par un point donné, appelé le *sommet* de la gerbe. Traduisons-le de façon analytique, c'est-à-dire avec des équations. Comme Clebsch, nous notons $a = 0$ une équation de plan ; dans cette écriture, il est sous-entendu que a est une forme linéaire non nulle en les quatre coordonnées homogènes de l'espace x_1, x_2, x_3, x_4 — l'équation s'écrit donc aussi $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = 0$. Maintenant, si p est un point de l'espace donné comme l'intersection de trois plans $a = 0$, $b = 0$ et $c = 0$, les plans de la gerbe de sommet p sont les plans d'équation $\chi a + \lambda b + \mu c = 0$, avec $(\chi : \lambda : \mu) \in E \stackrel{\text{déf.}}{=} \mathbf{P}^2(\mathbf{C})$ quelconque.

Revenons à la représentation des cubiques. Renvoyant à [60], Clebsch se base sur le fait qu'une surface cubique peut être décrite comme le lieu d'intersection de trois gerbes projectives de plans. Analytiquement, si on a trois gerbes projectives de plans¹⁰⁵ $\chi a + \lambda b + \mu c = 0$, $\chi a' + \lambda b' + \mu c' = 0$, $\chi a'' + \lambda b'' + \mu c'' = 0$, un point d'intersection de ces gerbes projectives est donné par un système

$$(S_\Lambda) \quad \begin{cases} \chi a + \lambda b + \mu c = 0 \\ \chi a' + \lambda b' + \mu c' = 0 \\ \chi a'' + \lambda b'' + \mu c'' = 0 \end{cases}$$

pour un $\Lambda = (\chi : \lambda : \mu)$ donné. Une surface cubique F_3 est donc formée de tous les points définis par tous les systèmes (S_Λ) possibles. Autrement dit, un point x appartient à F_3 si, et seulement s'il existe un (unique) $\Lambda = (\chi : \lambda : \mu)$ tel que x vérifie (S_Λ) . En particulier, on a ainsi une application $x \in F_3 \mapsto (\chi : \lambda : \mu) \in E$.

Partant de cela, Clebsch procède comme suit. Si $x \in F_3$, le système (S_Λ) a des solutions non triviales et on peut exprimer x_1, x_2, x_3, x_4 avec les formules dites de Cramer :

$$(*) \quad \begin{cases} \rho x_1 = f_1(\chi, \lambda, \mu) \\ \rho x_2 = f_2(\chi, \lambda, \mu) \\ \rho x_3 = f_3(\chi, \lambda, \mu) \\ \rho x_4 = f_4(\chi, \lambda, \mu) \end{cases}$$

où les f_i sont des fonctions homogènes de degré 3 (ce sont les déterminants extraits du système (S_Λ)) et ρ un facteur de proportionnalité. Ainsi, lorsqu'un point $(\chi : \lambda : \mu)$ n'annule pas simultanément les f_i , on peut définir un point x par les formules $(*)$. Cela donne une application $(\chi : \lambda : \mu) \mapsto x \in F_3$, réciproque de l'application obtenue précédemment, définie partout sauf en les points qui annulent

102. [8]. Cet article est celui que Geiser cite pour rappeler les propriétés de la représentation d'une surface cubique sur un plan. Cf. *infra*.

103. « Jedem Punkt der Ebene entspricht also im Allgemeinen ein Punkt der Fläche und umgekehrt ; ausgenommen sind davon nur sechs Punkten der Ebene, denen nicht Punkte der Fläche entsprechen, sondern Gerade [*sic*] ».

104. Voir par exemple [26, p. 401]. Merci à Clément Dupont et Florent Martin pour leurs explications sur les transformations birationnelles et les éclatements.

105. Voir [55, p. 4] pour la définition de la notion de *projectivité* de gerbes.

simultanment les f_i . Clebsch montre que ces points exceptionnels sont au nombre de 6 et fait remarquer que si Λ est un de ces six points, le systme (S_Λ) dfinit une droite de F_3 (en effet, l'annulation simultane des f_i implique que le rang du systme diminue de 1).

Ainsi est donc construite par Clebsch la reprsentation d'une surface cubique F_3 sur un plan E . Dans la suite de son article, il montre notamment quoi correspondent, dans cette reprsentation, les courbes algbriques incluses dans le plan E . Geiser rsume cette correspondance ainsi que les principes mmes de la reprsentation dans son article sur les surfaces quartiques conique double :

- (1) En gnral, chaque point de F_3 correspond un unique point de E , et rciproquement.
- (2) Dans E , il y a six points $\sigma_1, \dots, \sigma_6$ en position gnrale¹⁰⁶ tels qu' chacun d'eux correspond une droite contenue dans la cubique F_3 .
- (3) une courbe C_n incluse dans E et passant α_1 fois par σ_1 , α_2 fois par σ_2 , etc., correspond une courbe gauche C_N de degr $N = 3n - (\alpha_1 + \dots + \alpha_6)$, incluse dans F_3 , et rencontrant α_1 fois la droite correspondant σ_1 , α_2 fois la droite correspondant σ_2 , etc.

Toujours en citant Clebsch¹⁰⁷, Geiser donne ensuite de faon analogue les proprits caractrisant la reprsentation d'une surface quartique conique double F_4 sur un plan E :

- (1) En gnral, chaque point de la surface F_4 correspond un unique point de E , et rciproquement.
- (2) chaque point de la conique double C_2 de la quartique correspond un couple de points de E .
- (3) Dans E , il y a cinq points $s_1, \dots, s_5$ en position gnrale¹⁰⁸ tels qu' chacun d'eux correspond une droite contenue dans la quartique F_4 .
- (4) une courbe C_n incluse dans E et passant a_1 fois par s_1 , a_2 fois par s_2 , etc., correspond une courbe gauche C_N de degr $N = 3n - (a_1 + \dots + a_5)$, incluse dans F_4 , et rencontrant a_1 fois la droite correspondant s_1 , a_2 fois la droite correspondant s_2 , etc.

Ces proprits ayant t rappeles, Geiser poursuit en indiquant qu'une surface cubique et une surface quartique conique double peuvent tre mises en relation en les reprsentant sur un mme plan E , o il est mme possible de choisir $s_1 = \sigma_1, \dots, s_5 = \sigma_5$. Afin de mettre en correspondance les droites de ces surfaces, il dtaille leur provenance dans chacune des reprsentations¹⁰⁹. Ainsi, les vingt-sept droites de la surface cubique consistent en :

- (1) les six droites $\gamma_1, \dots, \gamma_6$ correspondant aux points $\sigma_1, \dots, \sigma_6$,
- (2) les quinze droites $\lambda_{\mu\nu}$ correspondant aux droites $\sigma_\mu\sigma_\nu$,

106. Nous traduisons ainsi l'expression « In E liegen sechs ausgezeichnete, ihrer Lage nach von einander unabhngige Punkte $\sigma_1, \dots, \sigma_6$ ». Ici, cela signifie que les σ_i ne sont pas sur une mme conique et sont trois trois non aligns.

107. L'article de Clebsch en question est [9]. L'auteur y construit une reprsentation des surfaces quartiques conique double par des moyens analogues ceux qu'il a utiliss pour la reprsentation des surfaces cubiques.

108. Ici, cela signifie que les points s_i sont trois trois non aligns. Voir la note 106.

109. Il ne le dmontre pas, mais ce qu'il nonce dcoule directement des proprits des reprsentations. Par exemple, pour les surfaces cubiques, il y a dj les six droites correspondant chaque σ_i vu la proprit 1 de la reprsentation. La proprit 3 permet de trouver les autres, qui sont des C_N avec $N = 1$: il s'agit donc de trouver des courbes C_n qui correspondent un C_1 . Il y en a quinze qui correspondent $n = 1$ et pour lesquelles deux des α valent 1 et les autres 0 : ce sont les droites joignant les σ_i deux deux. Il y en a six qui correspondent $n = 2$ et pour lesquelles tous les α valent 1, sauf un qui est nul : ce sont les coniques passant par cinq des σ_i sauf un. On obtient ainsi les vingt-sept droites.

- (3) les six droites $\Gamma_1, \dots, \Gamma_6$ correspondant aux coniques passant par cinq des six points $\sigma_1, \dots, \sigma_6$ (notées avec la convention que Γ_k correspond à la conique passant par les points autres que σ_k);

tandis que les seize droites des surfaces quartiques à conique double consistent en :

- (1) les cinq droites $g_1, \dots, g_5$ correspondant aux points $s_1, \dots, s_5$,
- (2) les dix droites l_{mn} correspondant aux droites $s_m s_n$,
- (3) la droite G_6 correspondant à la conique passant par les cinq points $s_1, \dots, s_5$.

Cela permet à Geiser d'associer ces droites entre elles comme ceci :

$$\begin{array}{lll} g_1, \dots, g_5 & ; & l_{12}, \dots, l_{45} & ; & G_6 \\ \gamma_1, \dots, \gamma_5 & ; & \lambda_{12}, \dots, \lambda_{45} & ; & \Gamma_6 \end{array}$$

et d'énoncer le résultat suivant : il est possible d'associer aux seize droites du F_4 , seize des vingt-sept droites du F_3 , dès lors que ces seize-là sont les seize restantes quand, parmi les vingt-sept, on en sélectionne une puis on l'élimine ainsi que les dix qui lui sont incidentes (par exemple γ_6 et $\lambda_{16}, \dots, \lambda_{56}, \Gamma_1, \dots, \Gamma_5$). De plus, les relations d'incidence entre les seize droites de chaque groupe sont les mêmes¹¹⁰.

FIGURE 3.5. Les représentations des surfaces F_3 et F_4 sur le même plan E , en faisant coïncider les points-base.

Seconde démonstration : généralisation du principe des rayons réciproques. La seconde démonstration du lien entre les droites des surfaces cubiques et des surfaces quartiques à conique double est présentée par Geiser comme

« [une] application d'une correspondance du second degré, qui est une généralisation du principe des rayons réciproques¹¹¹. » [22, p. 252]

Les idées de cette correspondance sont exposées dans la section III : étant donné une surface quadrique F_2 et un point P , on associe à tout point p de l'espace

110. Cette propriété est importante, car elle s'interprète en l'identité du groupe de l'équation aux seize droites et du groupe de l'équation de degré 16 obtenue en adjoignant une de ses racines à l'équation aux vingt-sept droites. Voir également la note 117.

111. « [eine] Anwendung einer geometrischen Verwandtschaft zweiten Grades, welche eine Verallgemeinerung des Principes der reciproken Radien ist ». Geiser indique en référence [19]. Quant au principe des rayons réciproques, en voici l'idée (telle qu'elle est exposée dans [20]) : dans un plan sont donnés un cercle K de centre M et un point p . On note P la polaire de p par rapport à K , c'est-à-dire la droite joignant les deux points de contact des deux tangentes à K menées par p . Il s'agit alors d'associer à p le point p' défini comme étant l'intersection des droites P et Mp .

le point p' dfini comme tant le quatrime harmonique p , s_1 et s_2 ¹¹², o ces derniers points s_1 et s_2 sont les points d'intersection de la droite Pp avec F_2 (voir la figure 3.6).

Geiser indique que l'application ainsi dfinie est en gnral univoque et rciproque (« *eindeutig und reciprok* »), avec deux cas exceptionnels : au point P lui-mme est associ le plan polaire E de P par rapport F_2 ¹¹³, et un point p de la conique C_2 intersection de E et F_2 est associe la droite pP .

FIGURE 3.6. Gnralisation du principe des rayons rciproques.

Sont ensuite nonces les rgles de correspondance des courbes et des surfaces par cette transformation. Ainsi, une courbe gauche C_n qui rencontre a fois C_2 et passe b fois par P , correspondent :

- (1) le plan E compt b fois,
- (2) un systme de a artes du cne K_2 de sommet P et de base C_2 ,
- (3) une courbe gauche $C'_{2n-(a+b)}$ qui rencontre C_2 en $2n - (a + 2b)$ points et passe $n - a$ fois par P .

Et une surface F_n contenant a fois le point P et contenant b fois la conique C_2 correspondent :

- (1) le plan E compt a fois,
- (2) le cne K_2 compt b fois,
- (3) une surface $F'_{2n-(a+2b)}$ qui contient $(n - 2b)$ fois le point P et $n - (a + b)$ fois la conique C_2 .

Dans la section IV, Geiser applique ensuite cette transformation au problme des surfaces quartiques conique double. Il considre donc une telle surface F_4 , note E le plan contenant la conique double C_2 et considre un point P situ sur F_4 mais pas sur C_2 . Le cne K_2 de sommet P et de base C_2 dfinit, avec le plan E compt double, un faisceau de quadriques. Geiser considre alors une des quadriques de ce faisceau (diffrente de C_2 et de E) qu'il note F_2 et qui va servir la correspondance dcrite prcdemment. Les rgles de transformation indiquent alors qu' la surface F_4 correspondent¹¹⁴ :

112. C'est--dire que p' est le point de la droite contenant p , s_1 et s_2 tel que ces quatre points forment, dans cet ordre, une division harmonique, c'est--dire tel que le rapport anharmonique (ou birapport) $\frac{p'p}{p's_1} : \frac{s_2p}{s_2s_1}$ de ces quatre points soit gal -1 .

113. Le *plan polaire* de P par rapport F_2 est le plan contenant la conique forme de tous les points M de F_2 tels que la droite PM est tangente F_2 . Avec des quations : si F_2 est donn par l'annulation d'une forme quadratique $q(x, y, z, w) = 0$, alors le plan polaire de P par rapport F_2 a pour quation $B(P, X)$, o on a not B la forme polaire de q et $X = (x, y, z, w)$.

114. Il suffit d'appliquer la rgle de transformation des surfaces avec $n = 4$, $a = 1$ et $b = 2$, ce qui traduit que la surface quartique contient P et C_2 comme conique double.

- (1) le plan E compté une fois,
- (2) le cône K_2 compté deux fois,
- (3) une surface cubique F'_3 contenant C_2 une fois mais ne contenant pas P ;

Et à une surface cubique quelconque F'_3 contenant une fois C_2 mais ne contenant pas P correspondent ¹¹⁵ :

- (1) le cône K_2 compté une fois,
- (2) une surface quartique F_4 avec C_2 comme conique double.

Cette transformation permet ainsi d'associer un point de F'_3 à un point de F_4 , et réciproquement, à quelques cas exceptionnels près. Par exemple, à P correspond, sur F'_3 , l'intersection de E avec F'_3 , c'est-à-dire la conique C_2 et une droite γ_6 . Geiser obtient ainsi une application du F_4 sur le F'_3 .

Enfin, Geiser s'occupe des droites des surfaces. En concordance avec ses notations antérieures, il note $\gamma_1, \dots, \gamma_5$; $\lambda_{12}, \dots, \lambda_{45}$; Γ_6 les droites de la surface cubique F'_3 qui ne rencontrent pas γ_6 . Ces droites rencontrent nécessairement C_2 , donc leur image par la correspondance est à chaque fois une droite de la surface F_4 ¹¹⁶. Celles-ci sont notées $g_1, \dots, g_5$; $l_{12}, \dots, l_{45}$; G_6 et Geiser indique que les relations d'incidence de ces seize droites sont les mêmes que pour les seize droites du F'_3 auxquelles elles correspondent ¹¹⁷.

En conclusion, Geiser fait une remarque comparative entre les deux correspondances entre surfaces cubiques et surfaces quartiques à conique double qu'il a présentées : pour lui, les deux coïncident, mais

« la seconde est une représentation plus directe, car elle met tout simplement F_4 et F'_3 en perspective par rapport à P . Cette seconde [correspondance] est ainsi à préférer pour déduire les propriétés du F_4 à partir de celles du F'_3 ¹¹⁸. » [22, p. 255]

Comme exemple de déduction de telles propriétés, il indique (sans pour autant développer) la distinction entre éléments réels et imaginaires sur la surface quartique.

Il y a ainsi une raison d'applicabilité dans le choix de Geiser d'avoir présenté sa seconde méthode; mais il ne justifie pas le fait d'avoir donné deux méthodes différentes. Nous nous contenterons ici de souligner que, tout comme Geiser avait, dans son article sur les tangentes doubles, proposé une preuve analytique après en avoir donné une synthétique, les deux méthodes donnant le lien entre les surfaces cubiques et les surfaces quartiques à conique double appartiennent l'une à la géométrie analytique et l'autre à la géométrie synthétique : rappelons en effet que le *Jahrbuch* a classé l'article en question en géométrie analytique (rubrique « Correspondance, transformation univoque, représentation ») et en géométrie synthétique.

Il est cependant intéressant de noter que dans son *Programme d'Erlangen*, Klein évoque entre autres la « géométrie des rayons réciproques ¹¹⁹ » et la « géométrie des transformations rationnelles », qui correspondent à l'une et à l'autre des preuves de

115. Geiser ne l'indique pas, mais il suppose ici que F'_3 contient C_2 avec multiplicité 1. Le résultat qui suit s'obtient en appliquant la règle de transformation avec $n = 3$, $a = 0$ et $b = 1$.

116. Geiser ne justifie pas ces affirmations. Pour la première, il faut remarquer que si γ est une des droites, son point d'intersection avec E est inclus dans $E \cap F'_3 = C_2 \cup \gamma_6$; mais comme γ et γ_6 sont disjointes, ce point d'intersection appartient nécessairement à C_2 . Pour déterminer ensuite l'image de γ sur F_4 , il suffit d'appliquer la règle de transformation des courbes en prenant $n = 1$, $a = 1$ et $b = 0$ (remarquer que γ ne contient pas le point P car F'_3 ne le contient pas).

117. À nouveau, cette remarque sur la concordance des relations d'incidence a son importance pour l'interprétation au niveau des groupes. Voir la note 110.

118. « Die zweite derselben eine directere ist, indem durch sie F_4 und F'_3 in Bezug auf P geradezu perspectivisch aufeinander bezogen sind. diese zweite wird darum vorzugsweise geeignet sein, die Eigenschaften der F_4 aus denen der F'_3 abzuleiten. »

119. « Die Geometrie der reciproken Radien », traduit en « La géométrie des rayons vecteurs réciproques » dans [41].

Geiser. Il est possible d'interprter le rsultat de Geiser en termes de ces gomtries : les surfaces cubiques et les surfaces quartiques conique double sont quivalentes la fois dans la gomtrie des transformations rationnelles et dans la gomtrie des rayons rciproques. Dans le *Programme*, si Klein fait des analogies entre la gomtrie des rayons rciproques et la gomtrie projectives, il crit galement que la thorie des transformations rationnelles n'est pas assez dveloppe pour qu'il puisse donner d'avantage que les « principes » d'une gomtrie des transformations rationnelles ; en particulier, il ne donne pas de lien entre cette gomtrie et la gomtrie des rayons rciproques ¹²⁰.

Que ce soit par les reprsentations de surfaces sur un plan ou par sa gnralisation du principe des rayons rciproques, Geiser a li les surfaces cubiques et les surfaces quartiques conique double par des transformations de l'espace. Ces transformations envoient les seize droites des quartiques sur seize des droites des surfaces cubiques de la faon que nous avons dj dcrite : parmi les vingt-sept droites d'une cubique, 16 droites qui ne sont pas incidentes une droite donne peuvent tre mises en correspondance avec les seize droites d'une surface quartique conique double, et cette correspondance conserve les relations d'incidence.

Comme prcdemment, nous pouvons mettre ce rsultat en relation avec le lien tabli par Jordan entre les vingt-sept droites et les seize droites. Rappelons que Jordan a indiqu que par adjonction d'une de ses racines, l'quation aux vingt-sept droites se scinde en deux facteurs de degrs 16 et 10, ayant mme groupe que l'quation aux seize droites. nouveau, interprtons l'adjonction d'une racine comme la slection d'une droite ; les facteurs de degr 16 et 10 correspondent aux racines associes aux droites non incidentes, respectivement incidentes, la droite donne par la racine adjointe (voir 3.1.2). Dire que le groupe du facteur de degr 16 est identique celui de l'quation aux seize droites se traduit alors par la conservation des relations d'incidence dans les transformations de Geiser. Encore une fois, ni Geiser ni Jordan ne proposent une quelconque correspondance entre leurs rsultats respectifs.

4. THORIE (DES SUBSTITUTIONS) ET GOMTRIE(S)

Rappelons qu'avant d'attaquer la lecture des preuves mathmatiques de Jordan et de Geiser, nous en tions rest une double constatation. D'une part, ces derniers affirmaient que leurs approches respectives taient bien distinctes au niveau disciplinaire, celle de Jordan relevant de l'algbre, ou plus prcisment de la thorie des substitutions, celle de Geiser relevant de la gomtrie. D'autre part, ils annonaient galement certaines relations d'inspiration, de prvision ou de confirmation entre leurs approches.

La lecture attentive des travaux de Jordan et de Geiser sur les liens entre vingt-sept, vingt-huit et seize droites que nous avons faite nous permet prsent de revenir sur ces deux points. D'abord, le cloisonnement disciplinaire des deux approches est largement confirm : Jordan utilise uniquement des techniques issues de la thorie des substitutions et Geiser uniquement des techniques de gomtrie et en particulier, aucun des deux n'emprunte l'autre un outil ou un morceau de preuve, de sorte que les deux approches sont totalement indpendantes l'une de l'autre.

Mais ce cloisonnement va plus loin, car aucune sorte de transfert heuristique, aucune traduction entre thorie des substitutions et gomtrie n'apparat, au contraire de ce que laissaient entendre les propos de nos deux protagonistes. Regardons pour commencer la situation des vingt-huit tangentes doubles, dans laquelle c'est Jordan qui s'est inspir de Geiser, d'aprs les commentaires que nous avons relevs au dbut de la section 3. Comme nous l'avons dj relev, Jordan ne fait aucune interprtation explicite entre ses rsultats et ceux de Geiser. Ainsi, l'adjonction d'une racine

120. Voir [41, p. 18 et p. 28].

n'est pas traduite en termes de distinction d'une tangente double particulière, et l'identité de la fonction ψ qu'il obtient et de la fonction φ correspondant aux vingt-sept droites n'est pas interprétée en termes géométriques, à savoir que les vingt-sept tangentes doubles restantes se répartissent trois par trois de la même façon que les vingt-sept droites se répartissent trois par trois en triangles. Comme nous l'avons vu, ce dernier résultat est donné par Geiser en conséquence de la répartition quatre par quatre des tangentes doubles suivant que les points de contact correspondants appartiennent à une même conique — et c'est d'ailleurs ce résultat-là, attribué à Clebsch par Jordan, qui permet à ce dernier de construire sa fonction φ dans le cas des vingt-huit tangentes doubles.

Dans le cas des seize droites, ce sont les travaux de Geiser qui ont suivi ceux de Jordan. Là non plus, l'adjonction d'une racine n'est pas interprétée comme la sélection d'une droite particulière. Par ailleurs, si Geiser met en évidence le fait que parmi les vingt-sept droites d'une surface cubique, on peut en mettre seize en rapport avec les seize droites des surfaces quartiques à coniques doubles lorsque ce sont les seize qui ne sont pas incidentes à une droite donnée, il ne relie pas cela à la factorisation de l'équation aux vingt-sept droites après adjonction d'une racine — rappelons qu'apparaissent deux facteurs, l'un correspondant aux droites incidentes à la droite associée à la racine adjointe, l'autre correspondant aux droites non incidentes à cette droite. Enfin, l'identité des relations d'incidence entre les seize droites des surfaces quartiques et celles, comme *supra*, des surfaces cubiques, est bien mise en valeur par Geiser, mais elle n'est pas interprétée en termes d'égalité de groupes.

Tout cela crée ainsi une certaine distance entre théorie des substitutions et géométrie, distance accentuée par les champs lexicaux particuliers de la prévision et de la confirmation relevés dans les discours de nos deux protagonistes. À ce sujet, le plus marquant est peut-être Geiser, qui relègue à deux reprises les travaux de Jordan à des suppositions, à des conjectures (« Vermuthung »). Ce dernier point soulève d'ailleurs la question de la véracité d'un résultat ou de la validité d'une preuve en fonction des techniques utilisées. Prenons toutefois garde au fait que nous ne sommes pas dans une situation où se confrontent deux preuves d'un même théorème : ici, il n'y a justement pas de formulation commune d'un théorème, ce qui participe d'autant plus au hiatus entre théorie des substitutions et géométrie. Les mots de Geiser semblent ainsi plus se rapporter à l'approche de Jordan dans son intégralité, plaçant la théorie des substitutions du côté de l'heuristique : cette théorie permet de deviner des résultats géométriques, mais doit être évacuée dans un deuxième temps pour ne conserver que la géométrie.

Une situation analogue est susceptible d'apporter quelque lumière sur notre cas : le lien entre l'équation aux vingt-sept droites et celle de la trisection des fonctions hyperelliptiques, résultat du *Traité des substitutions* faisant partie de ceux retrouvés par d'autres mathématiciens. Qualifiée par Cremona de « véritable énigme à expliquer », Jordan indique dès 1870 qu'il faudrait en trouver une « démonstration définitive ¹²¹ », alors que lui-même a en fourni une preuve dans le *Traité*. Celle qu'il propose dans la suite de sa lettre consiste à exhiber une certaine configuration de droites vérifiant la même équation que celle de la trisection des fonctions hyperelliptiques. Ainsi, nous avons à nouveau une situation où la théorie des substitutions révèle des liens entre deux configurations mathématiques avant d'être évacuée — cette fois-ci par Jordan lui-même.

121. La première citation est extraite d'une lettre de Cremona à Jordan datant du 19 décembre 1869 conservée aux Archives de l'École Polytechnique (référence VI2A2(1855) 9). Cette lettre, ainsi que sa réponse du 11 janvier 1870 dont est tirée notre seconde citation, ont été éditées par Simonetta Di Sieno et Paola Testi Saltini, et seront prochainement publiées (sous la direction de Giorgio Israel) dans une œuvre contenant la correspondance de Luigi Cremona. Nous remercions Giorgio Israel de nous avoir fait parvenir les lettres entre Cremona et Jordan.

Le lien entre vingt-sept droites et fonctions hyperelliptiques nous apprend plus : une quinzaine d'annes plus tard, alors que Klein labore une rsolution de l'quation aux vingt-sept droites par les fonctions hyperelliptiques calque sur ses travaux sur l'quation de degr 5, Jordan lui crit :

« Je suis persuad que le rapprochement que j'ai signal entre la trisection des fonctions elliptiques et les droites des surfaces cubiques n'est pas d un hasard et que les deux problmes doivent tre identiques au fond, et j'aimerais fort qu'on me le montrt ¹²². »

La recherche d'unit exprime ici nous invite penser que Jordan conoit les configurations dont nous parlons — vingt-sept droites et fonctions hyperelliptiques, et par extension liens entre vingt-sept, vingt-huit et seize droites — comme des phnomnes mathmatiques dvoils par le prisme de la thorie des substitutions ; l'unit n'inclut pas la thorie des substitutions, qui est plutt un moyen de l'observer.

Par ces remarques, les liens entre les trois configurations de droites tudies ici ne rejoignent pas tout fait la srie de thormes du XIXe sicle dont les mathmaticiens ont cherch et trouv des preuves diffrentes et indpendantes, comme par exemple la loi de rciprocit quadratique, la transcendance de e et de π , ou encore le thorme de clture de Poncelet ¹²³. Pour ces exemples en effet, il s'agit d'un nonc commun et de plusieurs dmonstrations, ventuellement hirarchises entre elles par leurs auteurs selon leur simplicit, leur efficacit, leur rigueur, leur potentialit de gnralisation, etc., ou vues dans leur multiplicit disciplinaire comme autant d'indices d'une unit mathmatique ¹²⁴. Dans notre cas, comme nous l'avons crit prcdemment, cette unit concerne ventuellement les trois configurations de droites, mais pas les deux pendants algbrique et gomtrique correspondant aux approches respectives de Jordan et de Geiser. D'autre part, nous avons dj soulign qu'il n'y a pas de formulation commune d'un thorme, et l'applicabilit de l'approche de Geiser l'nonc de Jordan (ou l'inverse) semble justement requrir une traduction entre gomtrie et thorie des substitutions.

Pour autant, ni Jordan ni Geiser ne semblent rechercher de dictionnaire entre thorie des substitutions et gomtrie. Les rapprochements disciplinaires en jeu ici forment ainsi une situation diffrente de celle du programme d'Andr Weil de partir des analogies entre thories des corps nombres algbriques, des corps de fonctions sur $\mathbf{C}$ et des corps de fonctions sur des corps finis, puis de chercher traduire les rsultats d'une thorie dans le langage des autres afin de profiter d'un enrichissement mutuel ¹²⁵.

Si le rapprochement que nous avons observ dans cet article reste finalement trs modr, c'est peut-tre aussi parce que, en 1870, la gomtrie et la thorie des substitutions n'en sont pas au mme stade de leur dveloppement. Gomtries synthtique et analytique pour le lien entre surfaces cubiques et courbes quartiques, thorie des reprsentations de surfaces et principe des rayons rciproques pour le lien entre surfaces cubiques et surfaces quartiques : la diversit des outils et des approches utiliss par Geiser pour traiter de sujets usuels ¹²⁶ — les courbes et surfaces algbriques particulires de petit degr — refltent l'inscription de ses travaux dans une gomtrie *alla* Steiner, sans refuser pour autant des outils de gomtrie

122. Extrait d'une lettre de Jordan Klein date du 26 juillet 1886 et conserve aux Archives de Gttingen (rfrence Cod. Ms. F. Klein 10).

123. Voir respectivement [45], [51, p. 201] et [16, 2]. En particulier sur Poncelet et la gnralit, voir [6].

124. Voir [23] pour les points de vue d'Hermite sur ce sujet.

125. [68].

126. Voir les chapitres II et III de [61]. La diversit des approches en question montre d'ailleurs la sensibilit de Geiser la multiplicit de preuves, ici l'intrieur de la gomtrie.

analytique¹²⁷ : ils s'ancrent ainsi dans une certaine continuité des développements géométriques de l'époque.

Au contraire, l'approche par Jordan des liens en question est originale pour deux raisons. D'abord, elle se place dans une théorie de Galois que Jordan, *via* le *Traité des substitutions* et les articles l'annonçant, est en train de remodeler et de dépasser, au point de faire de son ouvrage un jalon conceptuel dans le développement des idées de Galois¹²⁸. Ensuite, si l'on se réfère à l'article sur les « équations de la géométrie » de l'*Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften*, c'est la première fois que la théorie des substitutions est appliquée à ces équations algébriques issues de la géométrie¹²⁹. Notre étude de cas se situe ainsi à un moment charnière à la fois du développement de la théorie des groupes et du rapprochement de celui-ci avec la géométrie. Un autre moment fort de ce développement, centré autour de Klein, se situe dans le futur proche de cette étude.

En effet, toujours d'après le même article de l'*Encyklopädie*, le premier travail liant théorie des substitutions et géométrie publié après le *Traité des substitutions* est un article de Klein, paru en 1871 et intitulé « Ueber eine geometrische Repräsentation der Resolventen algebraischer Gleichungen¹³⁰ ». Il s'ouvre ainsi :

« La théorie générale des équations algébriques est illustrée de la plus belle des façons par des exemples géométriques particuliers ; je rappelle seulement (cf. Camille Jordan. *Traité des Substitutions*. Paris 1870, p. 310 et suiv.) le problème des points d'inflexion des courbes du troisième ordre, les 28 tangentes doubles des courbes du quatrième ordre, les 27 droites sur les surfaces du troisième degré etc. [...] Le grand avantage de ces exemples est qu'ils présentent de façon intuitive les idées abstraites en soi si particulières de la théorie des substitutions¹³¹. » [37, p. 346]

Klein poursuit en présentant l'idée qu'il souhaite mettre en œuvre : obtenir une « image géométrique » pour toutes les équations algébriques, en incarnant les racines d'une équation en objets géométriques et en remplaçant les permutations des racines par des transformations de l'espace échangeant entre eux ces objets. Ces mêmes idées sont à nouveau exprimées un an plus tard dans le *Programme d'Erlangen*, dans lequel Klein explique vouloir construire une théorie des groupes de transformations liée à la géométrie tout comme la théorie des substitutions a été construite, en particulier dans le *Traité des substitutions*, en liaison avec la théorie des équations. Le *Programme* évoque en particulier une notion d'adjonction d'un objet géométrique et du comportement des transformations vis-à-vis d'une telle adjonction :

127. Rappelons que dans le *Jahrbuch* de 1870, la théorie des représentations de surfaces est classée parmi la géométrie analytique.

128. Voir [13, p. 173-182].

129. [31, p. 518]. Nous avons vérifié que parmi les références données dans cet article, le *Traité des substitutions* et ses avatars sont les premiers où la théorie des substitutions est appliquée aux équations issues de la géométrie. Les références antérieures sont des travaux où ces équations sont étudiées avec les techniques de la théorie des équations comme la recherche et la formation explicite de résolvantes ; on n'y trouve pas d'articulation avec la géométrie comme celle que nous avons vues.

130. En français : « Sur une représentation géométrique des résolvantes d'équations algébriques ». [37].

131. « Die allgemeine Theorie der algebraischen Gleichungen wird in schönster Weise durch eine Anzahl besonderer geometrischer Beispiele illustriert ; ich erinnere nur (vgl. Camille Jordan. *Traité des Substitutions*. Paris 1870, S. 301 ff.) an das Problem der Wendepunkte der Kurven dritter Ordnung, an die 28 Doppeltangenten der Kurven vierter Ordnung, an die 27 Linien auf den Flächen dritten Grades usw. [...] Der hohe Nutzen dieser Beispiele liegt darin, daß sie die an und für sich so eigenartig abstrakten Vorstellungen der Substitutionstheorie in anschaulicher Weise dem Auge vorführen. »

« On donne une multiplicit¹³² et, pour en faire ltude, un de ses groupes de transformations. Soit propos dtudier les tres de la multiplicit eu gard lun deux. *On peut alors adjoindre celui-ci lensemble des tres et rechercher, au sens du groupe donn, les proprits du systme complet, soit ne rien adjoindre, mais borner les transformations prises pour base de ltude celles du groupe donn qui naltrent pas ltre considr (et qui forment ncessairement un groupe).* » [41, p. 9]

Cela semble nous donner une cl, que le lecteur aura peut-tre utilise spontanment, dune traduction gomtrique des liens de Jordan que nous avons tudis ici.

Notre tude de cas permet donc de saisir un rapprochement entre thorie des groupes et gomtrie survenant juste avant que Klein commence semparer de ces sujets. Parce quils se sont finalement imposs, les points de vue kleinens peuvent induire des biais dans notre lecture des travaux de Jordan et de Geiser sur les liens unissant les vingt-sept droites des surfaces cubiques, les vingt-huit tangentes doubles des courbes quartiques et les seize droites des surfaces quartiques conique double. Mais ces travaux font justement partie des sources dinspiration majeures de Klein : les tudier en dtail permet de comprendre sur quels aspects le regard avec lequel nous sommes tents de les lire est anachronique, mais surtout de mettre en vidence quelle barrire exacte Klein a d franchir pour que gomtrie et groupes (de transformations) fusionnent en une seule discipline.

RFRENCES

- [1] Lise BIOESMAT-MARTAGON : *Elments dune biographie de lEspace projectif*. Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 2011.
- [2] Henk J. M. BOS, Cees KERS, Frans OORT et Raven DIEDERICK : Poncelets closure theorem. *Expositiones Mathematicae*, 5:289–364, 1987.
- [3] Nicolas BOURBAKI : *Elments dhistoire des mathmatiques*. Springer, Berlin Heidelberg, 2007. rimpression inchange de ldition originale de 1984.
- [4] Frdric BRECHENMACHER : Self-portraits with variste Galois (and the shadow of Camille Jordan). *Revue dHistoire des Mathmatiques*, 17:271–369, 2011.
- [5] Arthur CAYLEY : On the triple tangent planes of surfaces of third order. *The Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, 4:118–132, 1849.
- [6] Karine CHEMLA : Lazare Carnot et la gnralit en gomtrie. Variations sur le thorme dit de Menelaus. *Revue dHistoire des Mathmatiques*, 4:163–190, 1998.
- [7] Alfred CLEBSCH : Ueber die Anwendung der Abelschen Functionen in der Geometrie. *Journal fr die reine und angewandte Mathematik*, 63:189–243, 1864.
- [8] Alfred CLEBSCH : Die Geometrie auf den Flchen dritter Ordnung. *Journal fr die reine und angewandte Mathematik*, 65:359–380, 1866.
- [9] Alfred CLEBSCH : Ueber die Flchen vierter Ordnung, welche eine Doppelcurve zweiten Grades besitzen. *Journal fr die reine und angewandte Mathematik*, 69:142–184, 1868.
- [10] Alfred CLEBSCH : Zum Gedchtniss an Julius Plcker. *Abhandlungen der kniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gttingen*, 16:1–40, 1872.
- [11] Alfred CLEBSCH : Rudolf Friedrich Alfred Clebsch – Versuch einer Darlegung und Wrdigung seiner wissenschaftlichen Leistungen. *Mathematische Annalen*, 7:1–55, 1873. crit par Alexander von BRILL, Paul GORDAN, Felix KLEIN, Jacob LROTH, Adolph MAYER, Max NTHER et Karl von der MHLL.
- [12] Leo CORRY : *Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures*. Birkhuser, Basel · Boston · Berlin, 2 dition, 2004.
- [13] Caroline EHRHARDT : *Itinraires dun texte mathmatique – Les rlaborations des crits dvariste Galois au XIX sicle*. Hermann, Paris, 2012.
- [14] Arnold EMCH : Carl Friedrich Geiser. *National Mathematics Magazine*, 12:286–289, 1938.

¹³². Le mot original est « Mannigfaltigkeit » (voir [38, p. 9]), que lon traduit plus volontiers par « varit ».

- [15] Gerd FISCHER : *Mathematische Modelle*. Vieweg, Braunschweig, 1986.
- [16] Jean-Pierre FRIEDELMEYER : Le théorème de clôture de Poncelet, une démonstration « imparfaite », qui fait toute une histoire... Dans Évelyne BARBIN et Dominique BÉNARD, éditeurs : *Histoire et enseignement des mathématiques – Rigueurs, erreurs, raisonnements*, pages 229–261. Institut National de Recherche Pédagogique – Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand (IREM), 2007.
- [17] Évariste GALOIS : Œuvres mathématiques. *Journal de Mathématiques pures et appliquées*, 11(1):381–444, 1846.
- [18] Sébastien GAUTHIER : *La géométrie des nombres comme discipline (1890-1945)*. Thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), 2007.
- [19] Carl Friedrich GEISER : Ueber eine geometrische Verwandtschaft des zweiten Grades. *Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern*, 580-602:97–107, 1865.
- [20] Carl Friedrich GEISER : *Einleitung in die synthetische Geometrie*. Teubner, Leipzig, 1869.
- [21] Carl Friedrich GEISER : Ueber die Doppeltangenten einer ebenen Curve vierten Grades. *Mathematische Annalen*, 1:129–138, 1869.
- [22] Carl Friedrich GEISER : Ueber die Flächen vierten Grades, welche eine Doppelcurve zweiten Grades haben. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 70:249–257, 1869.
- [23] Catherine GOLDSTEIN : Un arithméticien contre l'arithmétisation : les principes de Charles Hermite. Dans Dominique FLAMENT et Philippe NABONNAND, éditeurs : *Justifier en mathématiques*, pages 129–165. Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2011.
- [24] Catherine GOLDSTEIN, Norbert SCHAPPACHER et Joachim SCHWERMER, éditeurs. *The Shaping of Arithmetic after C. F. Gauss's Disquisitiones Arithmeticae*. Springer, Berlin, 2007.
- [25] Jeremy GRAY : *Linear Differential Equations and Group Theory from Riemann to Poincaré*. Birkhäuser, Boston, 2^e édition, 2000.
- [26] Robin HARTSHORNE : *Algebraic Geometry*. Springer, New-York, 1977.
- [27] Thomas HAWKINS : The *Erlanger Programm* of Felix Klein : Reflexions on its place in the history of mathematics. *Historia Mathematica*, 11:442–470, 1984.
- [28] Archibald HENDERSON : *The Twenty-Seven Lines upon the Cubic Surface*. Hafner publishing Co., New-York, 1911.
- [29] Otto HESSE : Algebraische Auflösung derjenigen Gleichungen 9ten Grades, deren Wurzeln die Eigenschaft haben, dass eine gegebene rationale und symmetrische Function $\theta(x_\lambda, x_\mu)$ je zweier Wurzeln x_λ, x_μ eine dritte Wurzel x_k giebt, so dass gleichzeitig : $x_\chi = \theta(x_\lambda, x_\mu)$, $x_\lambda = \theta(x_\mu, x_\chi)$, $x_\mu = \theta(x_\chi, x_\lambda)$. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 34:193–208, 1847.
- [30] Otto HESSE : Ueber Determinanten und ihre Anwendung in der Geometrie; insbesondere auf Curven vierter Ordnung. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 49:243–264, 1855.
- [31] Otto HÖLDER : Galois'sche Theorie mit Anwendungen. Dans *Encyclopädie der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen*, volume I. 1, chapitre B. 3. c, d, pages 480–520. Teubner, Leipzig, 1899.
- [32] Camille JORDAN : Sur l'équation aux vingt-sept droites des surfaces du troisième degré. *Journal de Mathématiques pures et appliquées*, 14(2):147–166, 1869. repr. dans [36, p. 249-268].
- [33] Camille JORDAN : Sur les équations de la géométrie. *Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, 68:656–659, 1869. repr. dans [36, p. 199-202].
- [34] Camille JORDAN : *Traité des Substitutions et des équations algébriques*. Gauthier-Villars, Paris, 1870.
- [35] Camille JORDAN : *Notice sur les Travaux de M. Camille Jordan*. Gauthier-Villars, Paris, 1881.
- [36] Camille JORDAN : *Œuvres de Camille Jordan*, volume 1. Gauthier-Villars, Paris, 1961-1964. Publié sous la direction de M. Gaston Julia, par M. Jean Dieudonné.
- [37] Felix KLEIN : Ueber eine geometrische Repräsentation der Resolventen algebraischer Gleichungen. *Mathematische Annalen*, 4:346–358, 1871.
- [38] Felix KLEIN : *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen*. Erlangen. Andreas Deichert, 1872.
- [39] Felix KLEIN : *Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade*. Teubner, Leipzig, 1884.
- [40] Felix KLEIN : *Gesammelte mathematische Abhandlungen*, volume 2. Springer, Berlin, 1922. Édité par Robert FRICKE et Hermann VERMEIL.

- [41] Felix KLEIN : *Le Programme d'Erlangen*. Jacques Gabay, Paris/Bruxelles/Montral, 1974. Traduction franaise de [38], prface de Jean DIEUDONN.
- [42] Louis KOLLROSS : Prof. Dr. Carl Friedrich Geiser. *Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft*, 115:521–528, 1934.
- [43] Franois L : Sur les vingt-sept droites des surfaces cubiques. Mmoire de D.E.A., cole Normale Suprieure de Lyon – Universit Claude Bernard Lyon 1, 2011. http://www.math.jussieu.fr/~lef/Accueil_files/Memoire.pdf.
- [44] Henri LEBESGUE : Notice sur la vie et les travaux de Camille Jordan. *Mmoires de l'Acadmie des Sciences de l'Institut de France*, 58:XXXIX–LXVI, 1926.
- [45] Franz LEMMERMEYER : *Reciprocity Laws – From Euler to Eisenstein*. Springer, Berlin Heidelberg New-York, 2000.
- [46] Gino LORIA : *Il passato ed il presente delle principali teorie geometriche*. Carlo Clausen, 2 dition, 1896.
- [47] Paul MANSION : Notice sur les travaux de Jules Plcker. *Bulletino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche*, 5:183–212, 1872. Traduction de [10].
- [48] Wilhelm Fritz MEYER : Flchen dritter Ordnung. Dans *Encyklopdie der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen*, volume III. 2. 2. B, chapitre C 10 a, pages 1437–1531. Teubner, Leipzig, 1928.
- [49] George Abram MILLER, Leonard Eugene DICKSON et Hans Frederick BLICHFELD : *Theory and Applications of Finite Groups*. John Wiley & sons, New-York, 1 dition, 1916.
- [50] Olaf NEUMANN : The *Disquisitiones Arithmeticae* and the theory of equations. Dans [24], chapitre II.1, pages 107–127. 2007.
- [51] Elena Petrovna OZHIGOVA : Problems of number theory. Dans Andre Nikolaevitch KOLMOGOROV et Adolph-Andre Pavlovich YUSHKEVICH, diteurs : *Mathematics of the 19th Century*, volume 1 : Mathematical Logic, Algebra, Number Theory, Probability Theory, chapitre 3, pages 137–209. Birkhuser, Basel · Boston · Berlin, 2 dition, 2001. avec l'aide de A.P. YUSHKEVICH.
- [52] Birgit PETRI et Norbert SCHAPPACHER : On arithmetization. Dans [24], chapitre V.2, pages 343–374. 2007.
- [53] Julius PLCKER : Gomtrie analytique. Recherches sur les courbes algbriques de tous les degrs. *Annales de Mathmatiques pures et appliques*, 19:97–106, 1828-1829.
- [54] Julius PLCKER : Gomtrie analytique. Recherches sur les surfaces algbriques de tous les degrs. *Annales de Mathmatiques pures et appliques*, 19:129–137, 1828-1829.
- [55] Theodor REYE : *Leons sur la gomtrie de position*. Dunod, Paris, 1882. Traduction franaise par Octave CHEMIN.
- [56] George SALMON : On the triple tangent planes to a surface of the third order. *The Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, 4:252–260, 1849.
- [57] George SALMON : *A Treatise on the higher plane curves*. Hodges and Smith, Dublin, 1 dition, 1852.
- [58] George SALMON : *A Treatise on the analytic geometry of three dimensions*. Hodges, Figgis & co, Dublin, 4 dition, 1882.
- [59] Ludwig SCHLFLI : An attempt to determine the twenty-seven lines upon a surface of the third order and to divide them into species in reference to the reality of the lines upon the surface. *The Quarterly Journal of Mathematics*, 2:55–65, 110–120, 1858.
- [60] Heinrich SCHRTER : Nachweis der 27 Geraden auf der allgemeinen Oberflche dritter Ordnung. *Journal fr die reine und angewandte Mathematik*, 62:265–280, 1863.
- [61] Fritz SCHTTE : *Die hauptschlichsten Theorien der Geometrie in ihrer frheren und heutigen Entwicklung*. Teubner, Leipzig, 1888. Traduction de la 1 d. de [46].
- [62] Joseph-Alfred SERRET : *Cours d'Algbre suprieure*. Mallet-Bachelier, Paris, 2 dition, 1854.
- [63] Jacob STEINER : Ueber die Flchen dritten Grades. *Journal fr die reine und angewandte Mathematik*, 53:133–141, 1856.
- [64] James Joseph SYLVESTER : Note sur les 27 droites d'une surface du 3 degr. *Comptes Rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences*, 52:977–980, 1861.
- [65] James Joseph SYLVESTER : Outline trace of the theory of reducible cyclodes. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 2:137–160, 1869.
- [66] Bartel Leendert van der WAERDEN : *A History of Algebra*. Springer, Berlin Heidelberg, 1985.

- [67] Heinrich WEBER : *Lehrbuch der Algebra*, volume 2. Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig, 2^e édition, 1898.
- [68] André WEIL : Une lettre et un extrait de lettre à Simone Weil. *Dans Œuvres scientifiques*, volume 1, pages 244–255. Springer, New-York, 1979.
- [69] Hans WUSSING : *Die Genesis des abstrakten Gruppen Begriffes*. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1969.

Manuscrit reçu le 18 octobre 2012,
révisé le 19 mars 2013,
accepté le 20 avril 2013.

François LÊ
Institut de Mathématiques de Jussieu, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), 4 place
Jussieu, 75005 Paris
lef@math.jussieu.fr